Klausur Wildtierhaltung 03.02.10

1. Definitionen:
 - **Population:** alle Tiere, die am Fortpflanzungsgeschehen teilnehmen
 - i. gemeinsamer Genpool der Individuen
 - ii. kann Spezies, Rasse, Linie sein
 - **Rasse:** Rassen weichen hinsichtlich morphologischer und physiologischer Merkmale der Nutzungseignung und der Leistungsfähigkeit innerhalb einer Spezies erheblich voneinander ab. Rassen unterscheiden sich in mindestens einem Merkmal (Körpergröße, Farbe). Mögliche Definitionen:
 - i. Tiere, die einem Herdbuch, einem straffen Zuchtprogramm und einer konsequenten Leistungsprüfung angehören
 - ii. Tiere, die eine Population darstellen
 - **Inzucht:** Paarung von Tieren einer Population, die enger miteinander verwandt sind als die Paarungspartner im Durchschnitt der Population.
 - **Generationsintervall:** ein Grundprinzip des Inzuchtmanagements ist die Verlängerung des Generationsintervalls
2. Eröffnung der **ersten Menagerie in Europa**, wann und wo? 1662/1668 in Versailles durch Louis XIV.
3. Eröffnung des **ersten Zoos in Europa**, wann und wo? 1828 in London
4. Was ist die **effektive Populationsgröße**?
 - ist ausschlaggebend für die Gefährdung einer Art oder Rasse (d. h. Zahl der Tiere sinkt unter Mindestgrenze)
 - $N_e = (4N_m N_f) / (N_m + N_f)$, wobei N_m = Anzahl männlicher Tiere, N_f = Anzahl weiblicher Tiere
 - N_e : entscheidet über Inzuchtsteigerung
 - $N_e < 200$ = Erhaltungspopulation
 - $200 < N_e < 1000$ = Beobachtungspopulation
 - $N_e > 1000$ = nicht gefährdete Population
5. **5 Aufgaben des Zoos** nennen:
 - Vertikale Ebenen:
 1. Ebene: Sorge für das Wohlbefinden (Langes Leben des Einzeltieres)
 2. Ebene: Zusammenstellung von Zuchtpaaren (Bestandssicherung der Tierart)
 3. Ebene: Globales Management der Tierart
 - Organisatorische Grundlagen:
 - i. Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle (Arten-Kommission)
 - ii. Erhebung demographischer und genetischer Analysen
 - iii. Abgabe sämtlicher Inzuchtkoeffizienten
 - iv. Darstellung der genetischen Repräsentation der Gründertiere
 - v. Erstellung eines Zuchtplans
6. **5 Grundprinzipien des Inzuchtmanagements** nennen:
 - i. Möglichst große Zahl an Gründertieren zum Aufbau einer Population mit ausgeglichenem Geschlechterverhältnis
 - ii. Population sollte rasch auf die gewünschte Größe anwachsen
 - iii. Genetische Merkmale aller Gründertiere müssen gleichmäßig repräsentiert werden.

- iv. Vermeidung von Inzuchtpaarungen
 - v. Limitierte Anzahl Bedeckungen pro Vatertier
 - vi. Gleiche Anzahl Nachkommen pro Zuchttier
 - vii. Jedes Vatertier durch einen Sohn, jedes Muttertier durch eine Tochter ersetzen
 - viii. keine Selektion
 - ix. Verlängerung des Generationsintervalls
7. Was ist **induzierte Ovulation bei Kameliden**, welche **Hormone** sind beteiligt?
- Deckakt induziert Ovulation (Follikel > 6-7mm)
 - Ovulation erfolgt nach 24 - 72 h (42 h)
 - Corpus luteum (CL) entwickelt sich 3-5 Tage nach dem Deckakt
 - Plasmaprogesteron > 2ng/mL → Stute spuckt!
 - Wenn es nicht zur Konzeption kommt, führt Prostaglandin ca. 10 - 12 Tage nach dem Deckakt zur Regression des CL
 - 3 - 15% spontane Ovulationen
 - < 10% multiple Ovulationen
8. **Ordnung, Familie und Unterfamilie** sämtlicher Vögel nennen (Fasan, Strauß, Wachtel, Perlhuhn, Taube)
- i. **Fasan:** Ordnung „Hühnervögel“ (Galliformes), Familie „Eigentliche Fasane“ (Phasianidae), Unterfamilie „Fasane“ (Phasianae)
 - ii. **Strauß:** Ordnung „Laufvögel oder Flachbrustvögel (Ratitae) (Struthioniformes) (5 Ordnungen: Strauße, Nandus, Kasuare [Kasuare und Emus], Kiwivögel, Steiße), Unterordnung „Strauße“ (Struthionidae), Art „Afrikanischer Strauß“ (Struthio camelus), Unterarten: Nordafrikanischer Strauß (S. c. camelus), Somalistrauß (S. c. molybdophanes), Massaistrauß (S. c. massaicus), Südafrikanischer Strauß (S. c. australis)
 - iii. **Wachtel:** Ordnung „Galliformes“ (Hühnervögel), Familie „Phasianidae“ (Fasanenartige), Unterfamilie „Perdicinae“ (Feldhühner)
 - iv. **Perlhuhn:** Ordnung „Hühnervögel“ (Galliformes), Familie „Fasanenartige“ (Phasianidae), Unterfamilie „Perlhühner“ (Numidinae)
 - v. **Taube:** Ordnung „Taubenartige“ (Columbiformes), Familie „Tauben“ (Columbidae), Unterfamilie „Eigentliche Taube“ (Columbinae)
 - vi.
9. Herkunftsland, Brutzeit, Mastdauer und Endgewichte aller Vögel

Vogel	Herkunftsland	Brutzeit	Mastdauer	Endgewicht
Fasan	Asien	Anfang April Eiablage	12 Wochen	980 g
Strauß	Asien	ab Mitte April (ca. 15-20), 42 Tage	9-14 Monate	100-110 kg
Wachtel	Japan, China	März-August (unter natürlichen Bedingungen)	6 Wochen	192,4 g
Perlhuhn	Zentral- und Westafrika	Legedauer ca. 10 Monate mit ca 160-180	10-12 Wochen, bei Auslauf 15- 16 Wochen	ca. 1566-1810 g

		Eiern, 27 Tage		
Taube	Mesopotamien (Irak)	Frühjahr bis Herbst	28. Tag	600-800 g

10. **Eibestandteile:** Gewicht, Dotter-, Eiklar-, Schalenanteile sämtlicher Vögel (wie oben + Huhn) aufzählen

Vogel	Gewicht g	Dotteranteil %	Eiklaranteil %	Schalenanteil %
Huhn (1980)	61	28,8	61,2	10,0
Perlhuhn	43	37,4	47,6	15,0
Taube	19	18,8	70,9	10,3
Wachtel	10	34,7	56,7	8,6
Strauss	1522	20,9	59,4	19,5

11. **5 Möglichkeiten der Genreserve** aufzählen:

- i. Lebendtierreserve (Genpool) ohne Sperma/Embryonen
 - a. männliche und weibliche Tiere
 - b. weibliche Tiere und KB
- ii. Kryokonservierung ohne Lebendreserve

12. **5 wichtige Probleme in der Straußenhaltung** aufzählen

- i. keine Dauerhafte Stallhaltung
- ii. Gehegegelände: mind. 40x40 m (> als 1 ausgewachsener Hahn)
- iii. Zaunhöhe: > 1,8 m
- iv. Stallhöhe: > 2,5 m
- v. runde Gehegeecken
- vi. Haltung muss u.a. durch Veterinäramt genehmigt werden (§11 TierSchG)
- vii. Offenstallhaltung mit uneingeschränktem Zugang zu großer Weide
- viii. Gruppenhaltung (max. 1 Hahn und 2-7 Hennen)
- ix. Unterstände (trocken, rutschfest) – möglichst mit Sandbad und Stroheinstreu: Wetterschutz, Schattenplätze, keine staunassen Böden
- x. Hanglagen ungünstig
- xi. > 2x1000 m² Standweide pro Zuchttrio (Hahn und 2 Hennen)
- xii. Triebwege nur zum Gehegewechsel (so kurz wie möglich) – in diesem Bereich häufig Federpicken → Umtrieb großer Stress, da stark territorial (deshalb besser 2000 m²)

13. Belegstellen und Gelée Royal erklären

- i. **Belegstellen:**
 - neben künstlicher Besamung (KB) wichtig bei gezielter Anpaarung
- i. **Gelée Royal:**
 - wird produziert von den Ammenbienen → aus Pollen und Honig in den Futtersaft- und Mandibeldrüsen
 - dient als Futter für die weiblichen Larven & Bienenkönigin, die in den Königinnenzellen (Weiselzellen) liegen
 - unterliegt AMG
 - „natürliches Mittel gegen chronische Unlust, Müdigkeit und Stressfolgen“
 - Hauptexporteure China und Osteuropa, 180€/kg

14. **4 Zuchtmerkmale Bienen** nennen

- i. Leistung: Honigleistung (Ertrag), Volksstärke (Anzahl besetzter Waben, Brutwaben), Frühjahrsentwicklung, Winterfestigkeit
- ii. Verhalten: Sanftmut, Wabensitz; Schwarmtrieb
- iii. Krankheitsanfälligkeit und Parasitentoleranz (z. B. Varroatose, Faulbrut)
- iv. Körpermerkmale: Farbmerkmale, Behaarung, Längenverhältnisse des Flügelgeäders

15. Welche Rassen stammen von Vikunja und ..?. ab? 4 Rassen

16. **2 Neuweltkameliden** nennen und ihre jeweilige **Domestizierungszeit**

- i. Lamas: ca. 4000-5000 v. Chr.
- ii. Alpakas: ca. 1500 v. Chr.

17. **2 Altweltkameliden** und ihr **Herkunftsland** aufzählen: Lamini und Camelini, westlich des Mississippis, vor ca. 3 Mio. Jahren Wanderung nach Asien und Südamerika

18. 3 spezielle **Eigenschaften des Blutkreislaufes** der Kameliden beschreiben

- i. Erythrozyten klein und oval
- ii. sehr hohe Sauerstoffaffinität: 50%-Sättigungspunkt, d. h. der Punkt, an dem Hämoglobin 50% der maximalen Sauerstofflast trägt, ist bei den meisten Spezies bei 27-42 mm Hg erreicht (bei Lamas bei 20)
- iii. gesamtes Blutzellvolumen geringer als bei den meisten Spezies – dadurch höhere Herzschlagrate

19. **3 Follikelphasen der Kameliden** aufzählen:

- Follikelreifungswellen von ca. 16-20 Tagen
- Wachstum mehrerer Follikel, von denen i. d. R. nur einer dominant wird:
 - i. Wachstumsphase: 3-5 Tage
 - ii. Reifephase: 2-8 Tage
 - iii. Rückbildungsphase: 3-5 Tage
- Wellen überlappen um 1-4 Tage
- Follikelbildung ganzjährlich – keine saisonalen Einflüsse in Mitteleuropa

20. **Fortpflanzungszyklus Damwild** erklären

- Hirsch:
 - i. Geschlechtsreife: 7-14 Monate → sexuelle Funktionen beginnen im Sommer
 - ii. Brunft: Höhepunkt der Spermienbildung, Drüsenaktivität und –größe; Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale
 - iii. Vorbrunft: Ende August/ September: gesteigerte Unruhe, wandern zu weiblichen Herden (älteste bleiben im Gebiet), Arealmarkierung durch Fegen
 - iv. Brunft: Oktober bis März (nach örtlichen Gegebenheiten)
 - v. Hauptbrunft: Oktober
 - vi. Brunftruf ähnelt mehr einem Schnarchen
 - vii. im Winter abklingen der Geschlechtsfunktionen

- viii. Brunftkämpfe ab Oktober bis November der Hirsche untereinander → Verletzungsgefahr
- Weibliche Tiere:
 - i. Geschlechtsreife: ca. 16 Monate
 - ii. Zykluslänge: 24-26 tage
 - iii. Ovulationen: Oktober bis Januar (polyöstrisch)
 - iv. Trächtigkeitsdauer: 229 (+- 3) Tage
 - v. Setzzeit: Mai-August
 - vi. Zwillingsrate: 1%
 - vii. Laktationsperiode: 9 Monate
 - viii. Euter mit 4 Zitzen
 - ix. Beschlagen geht schnell
 - x. Geschlechtsverhältnis: 1:30-40
- Geburt:
 - i. Setzzeit: Mai bis Ende August
 - ii. Geburt i. d. R. im Liegen
 - iii. Nachgeburt geht innerhalb 1. Stunde ab
 - iv. intensive Pflege des Kalbes
 - v. Abliegeplatz während der Säugezeit

21. Welche **Behörden** sind bei der **Genehmigung eines Damwildgeheges** beteiligt?

- Gewerbsmäßiger Zweck: untere Naturschutzbehörde
- öffentliche Zur-Schau-Stellung: Obere Naturschutzbehörde
- Veterinäramt
- Landwirtschaftsamt
- Baubehörde (untere Bauaufsichtsbehörde)
- Gemeinde
- Staatliches Forstamt

22. Für Rot-, Dam- und Sikawild die Tragzeit, Schlachtalter und Schlachtgewicht aufzählen

Gehege-/Gatterwild	Tragzeit	Schlachtalter	Schlachtgewicht
Rotwild	34 Wochen		
Damwild	229 (+- 3) Tage	15-17 Monate	Spießer: 35-55 kg Schmaltiere: 30-45 kg
Sikawild	ca. 218-228 Tage		