

Abb. 17:
Javesella pellucida (F.), meist langflügelig, ist sicherlich die häufigste Spornzikadenart Mitteleuropas.

Fig. 17:
Javesella pellucida (F.), usually macropterous - is probably the most abundant delphacid planthopper of central Europe.



2.5. Semiaquatische Lebensräume

2.5.1. Schlamm- und Kiesbänke

Im Gegensatz zu vielen anderen - auch semiaquatischen - Lebensräumen zeichnen sich Schlamm- und Kiesbänke in der unmittelbaren Überflutungszone stehender oder fließender Gewässer durch die Dominanz polyphager Generalisten mit hohem Ausbrei-

stens bivoltine Arten, die also nach einer Kolonisation im Frühsommer noch eine Generation im selben Jahr aufbauen können. Eine andere Lebensstrategie ist bei *Myndus musivus* (GERM.) zu erkennen, der auf einzeln stehenden und periodisch überfluteten Weidenbüschen lebt. Hier handelt es sich um eine univoltine und monophage Art mit unterirdisch lebenden Larven (s.a. Kap. 2.5.4).

tungs- und Fortpflanzungspotential aus, u.a. *Javesella pellucida* (F.), *Macrosteles sexnotatus* (FALL.), *M. laevis* (RIB.) und *M. cristatus* (RIB.); das gleiche gilt auch für andere periodisch gestörte Lebensräume, wie Ruderalstandorte und Feldkulturen (s. Kap. 3; KLIMEŠ et al. 1991, NOVOTNÝ 1994a, 1994b). Derartige Standorte können von den langflügeligen Tieren rasch besiedelt werden, gleichgültig, welche Pflanzenarten sich zuerst einstellen. Über die Reproduktionsrate dieser typischen Pionierarten sind zwar keine Details bekannt, doch handelt es sich ausschließlich um munde-

2.5.2. Röhrichte und Schwimmblattzonen

Sicherlich die am stärksten ans Wasser angepasste einheimische Zikade ist *Erotettix cyane* (BOH.), die in der Schwimmblattzone stehender, meist kleinerer und schattiger Gewässer lebt. Nährpflanzen sind *Potamogeton natans*, *Nuphar lutea* und andere Hydrophyten. Die Tiere sind bläulich gefärbt und daher auch vom Ufer oder von Stegen nachweisbar. Gelegentlich ist auch zu beobachten, wie sie über die Wasseroberfläche laufen.

Lange Zeit übersehen wurden die Bestödler der Teichsimsen-Röhrichte (*Schoenoplectus*

spp.), die oft nur im dauernd oder zumindest meist überfluteten Bereich von Verlandungsgürteln vorkommen und nur nach gezielter Suche nachweisbar sind. Es handelt sich um *Coryphaelus gyllenhalii* (FALL.) und *Parapotes reticulatus* HORV., die v.a. an *Sch. lacustris* an extensiv genutzten Fischteichen und eiszeitlichen Seen Nordostdeutschlands und im Alpenvorland vorkommen, sowie die weniger

Röhricht bildende Gräser mit spezifischen Gilden in Uferbereichen sind außerdem das Rohr-Glanzgras (*Phalaris arundinacea*) mit den monophagen Arten *Stenocranus major* (KBM.), *Paraliburnia adela* (FL.), *Balclutha rhenana* W.WG. und *Mocuellus metrius* (FL.), sowie der Wasser-Schwaden (*Glyceria maxima*) mit der für die Gattung *Glyceria* spezifischen *Struebiniella lugubrina* (BOH.).

Abb. 18: *Chloriona smaragdula* (StAl) ist einer der zahlreichen monophagen Spezialisten an Schilf (*Phragmites australis*).

Fig. 18: *Chloriona smaragdula* (StAl) is one of the many species feeding monophagous on reed (*Phragmites australis*).



stenotope *Calligypona reyi* (FIEB.), die auch Kleingewässer, Salzsümpfe und Kiesgruben besiedelt und auch an *Sch. tabernaemontani* lebt.

Die Zikadenfauna an Schilf (*Phragmites australis*) ist außergewöhnlich artenreich und weist mit mindestens 20 monophagen Arten die größte Zahl von Nährpflanzenspezialisten in der Flora ganz Mitteleuropas auf. Im Mittelmeergebiet nutzen einige dieser Arten jedoch auch Pfahlrohr (*Arundo donax*) als Nährpflanze (DROSOPOULOS et al. 1983). Die Verteilung der Arten wird wesentlich vom Wasserstand und Salzgehalt bestimmt; manche fehlen in permanent überfluteten Bereichen, andere sind auf Flachmoore, Salzstandorte u.ä. beschränkt. Da aber die Nährpflanze ihren Vorkommensschwerpunkt in zumindest temporär überfluteten Bereichen hat, soll hier die gesamte Gilde aufgeführt werden (Tabelle 13).

Art	Halmbereich	Habitat, Verbreitung
<i>Pentastiridius leporinus</i> (L.)	Larven unterirdisch	weit verbreitet, aber lokal
<i>Delphax crassicornis</i> (PANZ.)	basal	auch Bruchwälder
<i>Delphax inermis</i> RIB.	basal	v. a. mediterran
<i>Delphax pulchellus</i> (CURT.)	basal	auch Mähwiesen
<i>Euides alpina</i> W.WG.	basal	seltener; Alpen, Mähren
<i>Euides speciosa</i> (BOH.)	basal	eurytop
<i>Chloriona chinai</i> OSS.	apikal	nur im Norden
<i>Chloriona clavata</i> DLAB.	apikal	nur im Südosten
<i>Chloriona dorsata</i> EDW.	apikal	eurytop
• <i>Chloriona glaucescens</i> FIEB.	apikal	halobiont
<i>Chloriona sicula</i> MATS.	apikal	nur im Süden
<i>Chloriona smaragdula</i> (STAL)	apikal	v.a. Süßwasser
<i>Chloriona stenoptera</i> (FL.)	apikal	v.a. kühlere Standorte
<i>Chloriona unicolor</i> (H.-S.)	apikal	Salz- und Quellstandorte
<i>Chloriona vasconica</i> RIB.	apikal	eurytop
<i>Caliscelis wallengreni</i> STAL	basal	halobiont, nur im Südosten
<i>Paralimnus pulchellus</i> (R.)	apikal	nur im Süden
<i>Paralimnus phragmitis</i> (BOH.)	apikal	eurytop, auch Salzstandorte
<i>Paralimnus rotundiceps</i> (LETH.)	apikal	?
<i>Calamotettix taeniatus</i> (HORV.)	apikal	schwach halophil

Tab. 13: Übersicht über die Schilf besiedelnden Zikadenarten Mitteleuropas.
Table 13: Auchenorrhyncha species on reed (*Phragmites australis*) in central Europe.
Column labels: species, preferred part of stem, habitat/distribution.

2.5.3. Flutmulden

Periodisch überflutete, allerdings meist sommertrockene Wiesenmulden werden oft in großen Dichten von *Euconomelus lepidus* (BOH.), *Limotettix striola* (FALL.) und *Florodelphax paryphasma* (FL.) besiedelt. Die beiden ersteren leben an Sumpfried-Arten (*Eleocharis* spp.), *F. paryphasma* (FL.) lebt an Zweizeiliger Segge (*Carex disticha*).

Generell ist eine ganze Reihe von Arten in der Lage, dauerhaft auf regelmäßig überfluteten Standorten zu überleben (HILDEBRANDT & NICKEL 2002). SCHOPKE (1996) konnte wichtige Aspekte der zugrunde liegenden Mechanismen aufklären. Demnach können sich die Spornzikaden *Stenocranus minutus* (F.), *Dicranotropis hamata* (BOH.) und *Javesella pellucida* (F.) untergetaucht im Ei entwickeln, sterben aber beim Schlupf ab, wenn die Wirtspflanze bis dahin nicht trocken gefallen ist. Das gleiche gilt für die Blattzikade *Empoasca pteridis* (DHLB.). Die Deltocephalinen *Macrosteles sexnotatus* (FALL.), *Euscelis lineolatus* BR., *E. marocisus* REM. (aus Marokko) und *E. ormaderensis* REM. (aus Madeira) hingegen können auch unter der Wasseroberfläche schlüpfen, da die Larven eine hydrophobe Lipidschicht besitzen, die sie nach oben treibt. Die ökologische Relevanz dieser Befunde bedarf jedoch weiterer Untersuchungen, insbesondere im Hinblick auf das spezifische Überwinterungsstadium. So können im Adultstadium überwinterte Arten, z. B. *Stenocranus major* (KBM.) und *Balclutha rhenana* W.WG., die beide am Rohr-Glanzgras (*Phalaris arundinacea*) leben, zumindest kleinräumige Migrationen unternehmen, um den Winter- und Frühjahrshochwässern auszuweichen. Wie Larvalüberwinterer die v.a. im Frühjahr auftretenden Hochwässer überdauern, ist unklar.

2.5.4. Alpenflüsse

Gebirgsflüsse mit ihrem hohen Geschiebeaufkommen bei gleichzeitig geringer Wassermenge bieten eine große Habitatvielfalt auf engem Raum, die von vegetationslosen Schotterbänken über verlandende Altarme, Kleinsiegenriede, Kalkmagerrasen, Weiden- und Grauerlengebüsche bis hin zum sonnendurch-

fluteten Schneeheide-Kiefernwald reicht (LIPPERT et al. 1995; MÜLLER 1995; MÜLLER & BÜRGER 1990; SCHAUER 1998). Unregulierte Bereiche zeichnen sich durch einen hohen Grad an Naturnähe aus, der wegen regelmäßiger Überflutungen außerdem durch eine starke Dynamik geprägt ist. Im nord- und inneralpinen Raum sind inzwischen jedoch nahezu alle Flüsse begradigt und kanalisiert und somit als Lebensraum für die hochspezialisierten Pflanzen- und Tiergemeinschaften verloren. Lediglich am Oberlauf von Isar und Lech sind kurze Fließstrecken erhalten, die aber durch Straßenbau, Wasserentnahme und aufgrund ihrer isolierten Lage beeinträchtigt sind. In den West- und Südalpen hingegen, insbesondere an Piave, Tagliamento und Durance, sind noch weitgehend naturnahe Flussabschnitte erhalten.

In diesem Kapitel sollen nur die hochspezialisierten Besiedler der Schotterbänke besprochen werden. Sie kommen nur in ausgesprochen schütterten Beständen ihrer Nährpflanzen vor, die rasch der natürlichen Sukzession oder einer neuerlichen Überflutung zum Opfer fallen. Bemerkenswerterweise sind einige dieser Arten nicht nur hinsichtlich mikroklimatischer Faktoren spezialisiert, sondern sind überdies auch monophag, weisen nur eine einzige Generation pro Jahr, eine relativ geringe Ausbreitungsfähigkeit und ein kleines Gesamtareal auf (NICKEL 1999a).

Besonders bemerkenswert sind zwei Arten, die nach bisheriger Datenlage als Nordalpenendemiten zu bezeichnen sind. Es handelt sich um *Psammotettix unciger* RIB. und *Errastunus antennalis* (HPT.), die beide derzeit nur vom Lech und der Isar bekannt sind. Auch *Pseudodelphacodes flaviceps* (FIEB.) ist in Mitteleuropa sehr selten, kommt aber auch in den asiatischen Gebirgsregionen vor. Während die bisher genannten Arten Gräser besiedeln, leben die folgenden auf schütter stehenden Sträuchern (s.a. Tabelle 14): *Pentastiridius beieri* (W.WG.) wird meist von größeren, durch Überflutungen entwurzelten Weidenbüschen gestreift, *Mimallygus lacteinervis* (KBM.) von maximal kniehohen Jungweiden, v.a. *Salix purpurea*. *Opsius stactogalus* FIEB. schließlich lebt an Deutscher Tamariske

(*Myricaria germanica*), sekundär aber auch auf kultivierten Tamarisken in Parkanlagen und Gärten. Als einzige der hier genannten Arten sind seine Bestände daher nicht vom Aussterben bedroht. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden Kiesgruben als Sekundärlebensräume, nur von *Pentastiridius beieri* (W.WG.) nicht jedoch von den übrigen genannten Arten, besiedelt.

E. notata CURT., *Wagneripteryx germari* (ZETT.), *Macrosteles horvathi* (W.WG.), *Deltoccephalus pulicaris* (FALL.), *Idiodonus cruentatus* (PANZ.), *Cicadula quadrinotata* (F.), *Speudotettix subfuscus* (FALL.), *Thamnotettix confinis* (ZETT.), *Macustus griseus* (ZETT.), *Euscelis distinguendus* (KBM.), *Arocephalus languidus* (FL.), *Psamnotettix cephalotes* (H.-S.), *P. helvolicus* (KBM.), *Errastunus ocellaris* (FALL.), *Jassar-*



2.6. Alpine Lebensräume

2.6.1. Eurytope Gebirgsarten

Zwei Artengruppen kommen in fast allen Höhenstufen der Gebirge vor und können stellenweise beträchtliche Abundanzwerte erreichen. Zum einen handelt es sich um meist eurytope Arten, die auch im Tiefland weit verbreitet sind, u.a. *Cixius nervosus* (L.), *Kelisia monoceros* RIB., *Neophilaenus exclamationis* (THINBG.), *Anaceratagallia venosa* (GEOFFR.), *Erythria aureola* (FALL.), *Forcipata forcipata* (FL.), *Fagocyba cruenta* (H.-S.) s.l., *Eupteryx aurata* (L.), *E. cyclops* MATS., *E. collina* (FL.),

gus allobrogicus (RIB.), *Verdanus abdominalis* (F.) und *Diplocolenus bohemani* (ZETT.). Die Habitatpräferenzen innerhalb dieser Gruppe sind sehr unterschiedlich. Neben Arborikolen und Zwergstrauchbesiedlern sind hier v.a. Bewohner von höherwüchsigen Süß- und Sauergräsern zu finden.

Die zweite Gruppe von Arten ist geographisch weitgehend auf die Gebirgsregionen beschränkt, ohne jedoch eine bestimmte Höhenpräferenz zu haben (Tabelle 14). Sie kommen oft von den Tallagen der submontanen oder sogar kollinen Stufe bis in die subalpine oder alpine Stufe hinauf vor. In wenigen

Abb. 19: Die grüne Färbung mit weißen Flecken und dunklem Hinterende ist typisch für Tamarisken besiedelnde Insektenarten. Im Bild: *Opsius stactogalus* FIEB.

Fig. 19: The colouration of *Opsius stactogalus* FIEB. - green with white spots and dark posterior tip - is characteristic for many insects of tamarisks

Abb. 20:
Errastunus ocellaris (FALL.) ist eine häufige Art verschiedenartigster Grasbestände, die von den Tieflagen bis in subalpine Regionen zu finden ist.

Fig. 20:
Errastunus ocellaris (FALL.) is a common species of various grassy habitats, found from the lowlands up to the subalpine belt

Fällen, z.B. *Anaceratagallia austriaca* W.WG. und *Micantulina teucritii* (CER.), sind auch Einzelvorkommen im Hügelland bekannt. Auch hier sind die Gesamtareale oft klein und disjunkt. Einige Arten weisen ein klassisches boreo-alpines Verbreitungsmuster auf und sind in der Taigazone Sibiriens weit verbreitet, in Mitteleuropa aber auf die Gebirge beschränkt.

In diese Gruppe gehören nach derzeitigem Kenntnisstand auch *Macropsis remanei* NICK., *Wagneriala palustris* (RIB.), *Emposca dealbata* CER., *Kybos austriacus* (W.WG.), *Kybos digitatus* (RIB.), *Eupteryx genestieri* MEUSN., verschiedene *Jassargus*-Arten und vermutlich weitere, doch ist hier die Datenlage noch unzureichend.



Art	Nährpflanze	Höhe	Areal
<i>Cixius alpestris</i> W.WG.	? (polyphag)	sm-sa	Alpen, Karpaten
<i>Kelisia halpina</i> REM. & JUNG	<i>Carex humilis</i>	ko-sa	Alpen (auch Mähren)
<i>Kelisia hagemini</i> REM. & JUNG	<i>Carex humilis</i>	ko-sa	südeurop. Gebirge
<i>Achorotile albosignata</i> (DHLB.)	<i>Festuca?</i> , <i>Agrostis?</i>	ko?-al	Alpen - Sibiren
<i>Dicranotropis divergens</i> KBM.	<i>Festuca rubra</i>	sm-al	europ. Gebirge
<i>Ulopa carneae</i> W.WG.	<i>Erica carnea</i>	sm-al	Ostalpen
<i>Macropsis remanei</i> NICK.	<i>Salix eleagnos</i>	sm-mo	Alpen
<i>Agallia carpathica</i> MEL.	(polyphag)	mo?-sa	Karpaten
<i>Indiagallia limbata</i> (KBM.)	versch. Dikotyle	ko-sa	Ostalpen, Vorland
<i>Anaceratagallia austriaca</i> W.WG.	?	ko-al	Alpen (auch Franken)
<i>Anoscopus alpinus</i> (W.WG.)	Poaceae?	sm-al	Alpen, Mittelgebirge
<i>Erythria alpina</i> (VID.)	<i>Thymus</i> u.a.?	sm-sa	Südalpen
<i>Erythria manderstjernii</i> (KBM.)	versch. Dikotyle	sm-al	europ. Gebirge
<i>Erythria pedemontana</i> VID.	versch. Dikotyle?	sm-sa?	Südalpen
<i>Forcipata major</i> (W.WG.)	Cyperaceae?	sm-sa	Alpen - Sibiren
<i>Forcipata obtusa</i> VID.	Poaceae?	ko-al	Südalpen
<i>Micantulina teucritii</i> (CER.)	<i>Teucrium montanum</i>	ko-sa	südeurop. Gebirge
<i>Wagneriala franzi</i> (W.WG.)	Cyperaceae?	sm-mo	Alpen - Sibiren
<i>Kybos strobli</i> (W.WG.)	<i>Alnus incana?</i>	sm-sa	Alpen, Karpaten
<i>Eupteryx heydenii</i> (KBM.)	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	sm-sa	europ. Gebirge
<i>Ebarrius interstinctus</i> (FIEB.)	Poaceae indet.	ko-al	südeurop. Gebirge
<i>Jassargus alpinus</i> (THEN)	Poaceae	sm-al	W-Europa - Sibiren
<i>Jassargus bisubulatus</i> THEN	Poaceae?	ko-mo	Südalpen

Tab. 14:
Gebirgsarten ohne deutliche Höhenpräferenz (ko = kollin, sm = submontan, mo = montan, sa = subalpin, al = alpin).

Table 14:
Auchenorrhyncha species of mountains without distinct altitudinal preference. Column labels and abbreviations: species, food plant, altitudinal belt (ko = colline, sm = submontane, mo = montane, sa = subalpine, al = alpine), distribution.

2.6.2. Matten

Alpines und subalpines Grünland ist in Mitteleuropa beschränkt auf die höheren Lagen der Alpen, der Tatra und des Riesengebirges (je nach geografischer Lage und Exposition) oberhalb von etwa 1500m ü.NN. Durch menschliches Einwirken wurde die Bewaldung vielerorts auch in tieferen Lagen drastisch reduziert, was zu einer Ausweitung des Grünlandes geführt hat. Entlang von Lawenbahnen, Schipisten und Flüssen können alpine Pflanzengesellschaften mehr oder weniger fragmentarisch auch bis in die Tallagen vordringen. Abgesehen vom Riesengebirge wird die klimatische Baumgrenze in den Mittelgebirgen nirgends erreicht, doch sind die Wälder der höchsten Kammlagen vielerorts aufgrund ihrer extremen Witterungsexposition und edaphischer Faktoren, in jüngerer Zeit auch durch die Luftverschmutzung, aufgelichtet oder sogar ganz verschwunden, z.B. in den Vogesen, im Schwarzwald und Bayerischen Wald (ELLENBERG 1996).

Obwohl sich das alpine Grünland physiognomisch kaum von dem des Tieflandes unterscheidet, weist seine Zikadenfauna zahlreiche Spezialisten auf, welche nur selten auch in tieferen Lagen angetroffen werden, wo dann - ähnlich wie bei manchen Alpenpflanzen - vorzugsweise Flussschotter und Moore besiedelt werden.

Publizierte Daten zur Höhenverbreitung sind z.T. kritisch zu betrachten, da häufig Tieflandsarten in geringerer Zahl mit dem Wind in höhere Lagen eingeweht werden, ohne dort zu reproduzieren. Wo immer möglich, basieren die hier gemachten Angaben auf eigene Freilanddaten sowie Literaturangaben, die mit genauen Fangzahlen versehen sind.

In Tabelle 15 sind alle Arten aufgelistet, die in Mitteleuropa ausschließlich oder weitgehend auf subalpine oder alpine Höhenlagen beschränkt sind. Ergänzend wurden Daten von CERUTTI (1939), CHRISTANDL-PESKOLLER & JANETSCHKE (1976), DELLA GIUSTINA (1989), DOBLER (1985), GÜNTHART (1984, 1987, 1997), HOLZINGER (1999a), LEISING (1977), REMANE & FRÖHLICH (1994b), VIDANO (1965) und WAGNER & FRANZ (1961) herangezogen.

Biogeografisch gesehen handelt es sich bei vielen alpinen Arten um Endemiten der europäischen Hochgebirge (vgl. Tabelle 15); einige sind auf die Alpen beschränkt, z.B. *Sotanus thenii* (P. LOW) und *Psammotettix nardeti* REM., weitere sogar auf einzelne Gebirgsmassive der Süd- bzw. Westalpen, z.B. *Diplocolenus quadricornis* RIB. und *Jassargus baldensis* SCHULZ (KNIGHT 1974; SCHULZ 1976). Allerdings ist hier zu bedenken, dass die Zikadenfauna vieler Gebirgsregionen noch völlig unerforscht ist, und dass noch umfassende Revisionen von paläarktisch verbreiteten Gattungen nötig sind, welche vermutlich eine Reihe von Synonymisierungen asiatischer und europäischer Artnamen zur Folge haben werden. Der Endemitenanteil der europäischen Gebirgsfauna dürfte daher vermutlich niedriger liegen. Hinzu kommt, dass es durch die stärkere räumliche Isolation der oftmals nur kleinen Gebirgspopulation bei diesen Arten zu verstärkter und beschleunigter Merkmalsdivergenz kommt. So wurden in einigen Fällen morphologisch geringfügig von den Nominatformen abweichende Individuen

als eigenständige Subspezies oder gar Spezies beschrieben (DELLA GIUSTINA 1989; DLABOLA 1980; GĘBICKI & SZWEDO 1991; HELLER 1975; WAGNER 1955). Unklar ist auch die taxonomische Situation in der Gruppe um *Psammotettix helvolus* (KBM.). Für nur äußerlich, nicht aber genitalmorphologisch unterscheidbare Populationen wurden u.a. die Namen *P. obtusiceps* (KBM.) und *P. rhombifer* (FIEB.) verge-

Art	Nährpflanze	Höhe	Areal
<i>Cixius heydenii</i> KBM.	? (polyphag)	mo-al	europ. Gebirge, Sibirien
<i>Dicranotropis montana</i> (HORV.)	<i>Deschampsia cespitosa?</i> u.a.	mo-sa	Alpen, Karpaten, Sibirien?
<i>Ribautodelphax pallens</i> (STAL)	<i>Festuca ovina</i>	mo-al	nordeurop. Gebirge, Alpen
<i>Emelyanoviana contraria</i> (RIB.)	?	sa-al	westeurop. Gebirge
<i>Erythria cisalpina</i> DWOR.	?	sa?	Alpen, Dinarische Gebirge
<i>Edwardsiana rosaeugans</i> (CER.)	<i>Rosa pendulina</i>	mo-sa	europ. Gebirge
<i>Eupteryx austriaca</i> (METC.)	<i>Knautia dipsacifolia</i>	mo-sa	europ. Gebirge
<i>Arboridia alpestris</i> (RIB.)	?	sa	Südwestalpen
<i>Zyginidia cornicula</i> MEUSN.	Poaceae indet.	sa-al	Südwestalpen
<i>Zyginidia franzi</i> (W.WG.)	<i>Sesleria albicans?</i>	mo-al	Alpen, Karpaten
<i>Zygina hypermaculata</i> REM. & HOLZ.	<i>Hypericum maculatum</i>	mo-sa	Ostalpen
<i>Macrosteleus alpinus</i> (ZETT.)	<i>Carex</i> spp.	mo-al	Alpen - Sibiren, Amerika
<i>Hardya alpina</i> W.WG.	Poaceae indet.	mo-al	Alpen (- Mittelalpen?)
<i>Streptopyx tamaninii</i> LNV.	?	sa-al	Südalpen
<i>Sotanus thenii</i> (P. LOW)	Poaceae indet.	sa-al	Alpen
<i>Arocephalus grandii</i> SERV.	Poaceae?	mo-sa	Südalpen, Kaukasus
<i>Psammotettix dubius</i> OSS.	Poaceae?	mo-sa	Nordeuropa, Alpen
<i>Psammotettix nardeti</i> REM.	Poaceae indet.	sa-al	Alpen
<i>Ebarrius cognatus</i> (FIEB.)	<i>Festuca?</i>	mo-al	europ. Gebirge
<i>Jassargus baldensis</i> SCHULZ	Poaceae indet.	al?	Südalpen
<i>Jassargus bobbiicola</i> SCHULZ	Poaceae indet.	al?	Südalpen
<i>Rosenus laciniatus</i> (THEN)	Poaceae indet.	al	Ostalpen, N-Holarktis
<i>Diplocolenus convenarum</i> RIB.	Poaceae?	sa	Südwestalpen, Pyrenäen
<i>Diplocolenus nigricans</i> (KBM.)	Poaceae indet.	sa?	Südalpen
<i>Diplocolenus penthopitta</i> (WALK.)	Poaceae indet.	sa	Alpen, Sudeten
<i>Diplocolenus quadricornis</i> RIB.	Poaceae?	?	Südwestalpen
<i>Verdanus bensoni</i> (CHINA)	Poaceae	mo-sa	europ. Gebirge

ben, die derzeit aber von den meisten Autoren als jüngere Synonyme betrachtet werden.

Die Poaceae sind eindeutig die wichtigsten Nährpflanzen. Dementsprechend dominieren auf vielen Standorten Arten aus Gattungen, die den weitgehend graminicolen Paratimnini zugehören (v.a. *Arocephalus*, *Psammotettix*, *Jassargus* und *Diplocolenus*). Nur in wenigen Fällen werden Arten der Cyperaceae genutzt. Über die Breite des Nahrungsspektrums alpiner Zikaden ist nur sehr wenig bekannt. Einerseits spricht die oftmals sehr fleckenhafte Verteilung der meisten Arten für einen hohen Anteil von Spezialisten, andererseits dominieren zumindest in der subalpinen Stufe polyphage Generalisten (s.u.).

Die Individuendichten sind offenbar deutlich niedriger als im Tiefland. DOBLER (1985)

Tab. 15: Mitteleuropäische Zikadenarten mit Vorkommensschwerpunkt in subalpinen und alpinen Lagen. Abkürzung: mo = montan, sa = subalpin, al = alpin.

Table 15: Subalpine and alpine Auchenorrhyncha species of central Europe. Column labels and abbreviations: species, food plant, altitudinal belt (ko = colline, sm = submontane, mo = montane, sa = subalpine, al = alpine), distribution.

fund in einer hochalpinen Grasheide (2600m ü.NN) im August mittlere Abundanzen von 9 bis 60 Ind./qm. Auch beim nichtquantitativen Käschern sind vielerorts nur sehr geringe Individuenzahlen auffällig.

Wie weit hinauf die Zikadenbesiedlung reicht, wird stark von der Exposition und dem kleinräumigen Relief bestimmt. Während z.B. in den Bayerischen Alpen manche Standorte bereits auf 2000m ü.NN zikadenleer erscheinen, gibt GÜNTHART (1984, 1987) für die Schweizer Zentralalpen den höchstgelegenen Fundort von *Psammotettix helvolus* (KBM.) mit 3060m ü.NN an. Doch dürften derartige Standorte selbst in den Südalpen an der äußersten Höhengrenze liegen, wo Zikaden noch dauerhaft leben können. Nach LEISING (1977) kommen *Psammotettix helvolus* (KBM.) und *Ebarrius cognatus* (FIEB.) in Tirol noch kontinuierlich bis 2820m ü.NN vor, *Sotanus thenii* (P. LÖW) sogar bis 2920m ü.NN.

Von allen Alpenbewohnern ist *Rosenus laciniatus* (THEN) wohl diejenige Art mit den geringsten Temperaturansprüchen und aufgrund ihrer arktisch-alpinen Verbreitung wohl als ausgesprochenes Kaltzeitrelikt zu interpretieren (vgl. NAST 1972; OSSIANNILSSON 1983). Nach HOLZINGER (1999b) ist sie in Mitteleuropa auf Gipfelbereiche und Windkantenrasen der alpinen Stufe der östlichen Zentralalpen beschränkt und dort zwischen 2100 und 2300m ü.NN stellenweise die dominierende Art. Ihre Höhenobergrenze ist nicht bekannt.

2.6.3. Krummholzbestände

In der subalpinen Stufe vollzieht sich der Übergang vom alpinen Grünland zum montanen Wald. Die Vegetation wird geprägt von niedrigem, undurchdringlichen Gebüsch und üppigen Hochstaudenfluren. In den Zentralalpen kommen als Baumarten Lärche (*Larix decidua*) und Zirbel-Kiefer (*Pinus cembra*) hinzu, meist dominieren aber Gebüsche aus Latschen-Kiefer (*Pinus mugo*) und Grün-Erle (*Alnus viridis*). Außerhalb der Alpen treten diese Gesellschaften allerdings nur noch fragmentarisch auf. Durch die Weidewirtschaft sind die Gebüsche vielerorts stark zurückgedrängt und durch Grünland ersetzt worden. Andererseits reicht die subalpine Vegetation an kalten Schatthängen, Lawinenbahnen, Steilhängen und anderen Sonderstandorten

auch natürlicherweise in die Montanwaldstufe hinab. Die Höhenlage schwankt daher je nach geografischer Lage und Exposition sehr stark und reicht von etwa 1300m ü.NN im Riesengebirge bis über 2200m ü.NN in den Zentralalpen (ELLENBERG 1996).

Die Zikadenfauna besteht vorwiegend aus einem Artengemisch von Tieflands- und Gebirgsarten. Einer eigenständigen, für die Krummholzstufe spezifischen Fauna gehören nur wenige Arten an, die alle auch in lichten Bereichen des montanen Waldes tieferer Lagen vorkommen (s. Tabelle 15). Unter den Gehölz- und Staudenbesiedlern sind hier insbesondere *Cixius heydenii* KBM., *Edwardsiana rosaesugans* (CER.), *Eupteryx austriaca* (METC.) und *Zygina hypermaculata* REM. & HOLZ. zu nennen, möglicherweise auch *Erythria cisalpina* DWOR. und *Arboridia alpestris* (RIB.). Für die Grasschicht dieser Höhenstufe ist *Diplocolenus penthopitta* (WALK.) spezifisch, der nach LAUTERER (pers. Mitt.) in den Sudeten eine Charakterart grasiger Lawinenbahnen ist, vermutlich auch *Arocephalus grandii* SERV., *Psammotettix dubius* OSS. und weitere *Diplocolenus*-Arten. Bemerkenswert ist außerdem *Cicadula quinquenotata* (BOH.), die in Mitteleuropa nur in den Zwischenmooren der norddeutsch-polnischen Tiefebene und der subalpinen Stufe der Ostalpen bekannt ist (HOLZINGER 1999a; SCHIEMENZ et al. 1996; WAGNER 1937; WAGNER & FRANZ 1961).

Die Individuendichten sind i.d.R. höher als in der alpinen Stufe. In quantitativen Saugfängen stellte DOBLER (1985) auf einer subalpinen Mähwiese in Tirol (1960m ü.NN) im August mittlere Abundanzen von 30 bis 140 Ind./qm fest. Dabei dominierte *Erythria manderstjernii* (KBM.) mit 83% des Gesamtfanges deutlich; weitere 15% stellte *Verdanus abdominalis* (F.). In umfangreichen Malaisefallenfängen aus subalpinen Lagen der Bayerischen und Allgäuer Alpen stellten Blattzikaden (Typhlocybinæ) rund 75% der Gesamtindividuenzahlen, allerdings nur rund 33% der Artenzahlen. Am individuenreichsten vertreten waren *Wagneripteryx germani* (ZETT.), *Forcipata forcipata* (FL.), *Erythria manderstjernii* (KBM.), *Fagocyba cruenta* (H.-S.) var. *douglasi* (EDW.) und *Eupteryx notata* CURT. Unter den 10 häufigsten Arten dominierten polyphage, im Eistadium überwinternde, langflügelige und univoltine Arten (Nickel unveröff.).

Angaben zu Artengemeinschaften subalpiner Lebensräume sowie zur Biologie und Verbreitung einzelner Arten liefern u.a. CERUTTI (1939), DELLA GIUSTINA (1989), DOBLER (1985), GÜNTHART (1987, 1997), HOLZINGER (1999a), LEISING (1977), NICKEL (1999b), VIDANO (1965) und WAGNER & FRANZ (1961).

3. Anthropogen geprägte Offenlebensräume

3.1. Wirtschaftsgrünland

Das mitteleuropäische Wirtschaftsgrünland ist nahezu ausnahmslos auf ehemaligen Waldstandorten zu finden; der Aufwuchs von Gehölzen wird aber durch regelmäßige Mahd oder Beweidung verhindert, so dass die Dominanz von Süß- oder Sauergräsern erhalten bleibt. Grob verallgemeinert spielen die Cyperaceae eine größere Rolle auf nasen-, nährstoffarmen und weniger intensiv oder gar nicht genutzten Standorten, während die Poaceae auf den meisten frischen oder trockeneren, nährstoffreichen und intensiver genutzten Standorten dominieren. Beide Familien sind mit Abstand die zikadenartenreichsten Pflanzengruppen in Mitteleuropa. Die Gilden der Sauergräser sind daher im Kapitel der Niedermoore (Kap. 2.4.2, Tabelle 11) besprochen. Allein an den Süßgräsern saugen insgesamt über 220 Arten, von denen ein großer Teil auch im Wirtschaftsgrünland vorkommt. Nicht vertreten sind lediglich die meisten Besiedler von Schilf (*Phragmites australis*), den Reitgras-Arten (*Calamagrostis* spp.) und einigen Gräsern von Sonderstandorten, z.B. Silbergras (*Corynephorus canescens*) und Strandhafer (*Ammophila arenaria*). Die weiter verbreiteten Zikadenarten der wichtigsten Süßgräser im Wirtschaftsgrünland sind in Tabelle 16 aufgeführt. Weitere Nährpflanzen für Zikaden sind u.a. verschiedene Leguminosen (*Trifolium*, *Medicago*, *Lathyrus*) und Asteraceen (*Achillea*, *Leontodon*, *Taraxacum*), außerdem Wegerich (*Plantago* spp.), Wiesen-Salbei (*Salvia pratensis*) und Kriech-Hahnenfuß (*Ranunculus repens*).

Art	<i>Molinia caerulea</i>	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Alopecurus</i> spp.	<i>Phleum</i> spp.	<i>Arrhenatherum elatius</i>	<i>Trisetum flavescens</i>	<i>Deschampsia cespitosa</i>	<i>Deschampsia flexuosa</i>	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Agrostis stolonifera</i>	<i>Nardus stricta</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Festuca pratensis</i>	<i>Festuca arundinacea</i>	<i>Festuca rubra</i>	<i>Festuca ovina</i>	<i>Lolium perenne</i>	<i>Poa annua</i>	<i>Poa pratensis</i>	<i>Poa trivialis</i>	<i>Elymus repens</i>	
<i>Muellerianella extrusa</i> (SCOTT)	X																						
<i>Jassargus sursumflexus</i> (THEN)	X																						
<i>Ribautodelphax angulosus</i> (RIB.)		X																					
<i>Megadelphax sordidulus</i> (STAL)					X																		
<i>Acanthodelphax denticauda</i> (BOH.)							X																
<i>Muellerianella brevipennis</i> (BOH.)							X																
<i>Streptanus confinis</i> (REUT.)							X																
* <i>Muellerianella fairmairei</i> (PERR.)								X															
<i>Xanthodelphax stramineus</i> (STAL)									X	?													
<i>Cicadula persimilis</i> (EDW.)													X										
<i>Stenocranus minutus</i> (F.)												X											
<i>Arthaldeus striifrons</i> (KBM.)													X										
<i>Ribautodelphax imitans</i> (RIB.)														X									
<i>Dicranotropis divergens</i> KBM.															X								
<i>Acanthodelphax spinosus</i> (FIEB.)															X								
<i>Delphacinus mesomelas</i> (BOH.)															X								
<i>Eupelix cuspidata</i> (F.)															X								
<i>Rhopalopyx adumbrata</i> (SHLB.)															X								
<i>Arocephalus punctum</i> (FL.)															X								
<i>Ribautodelphax albostrigatus</i> (FIEB.)																X							
<i>Xanthodelphax flaveolus</i> (FL.)																							
<i>Eurybregma nigrolineata</i> SCOTT								X															X
<i>Stiroma bicarinata</i> (H.-S.)					X	X						X											X
* <i>Laodelphax striatellus</i> (FALL.)			?	?	?													?	?	?			?
<i>Delphacodes venosus</i> (GERM.)	X						X			X				?	X								
<i>Dicranotropis hamata</i> (BOH.)					?			X					X	X									X
<i>Criomorpha albomarginatus</i> CURT.						X	X	?							X								
* <i>Javesella pellucida</i> (F.)	X	X	X	X	?	X	?	X	X	X	X	X	?	X	X	?	X	X	X	X	X	X	X
<i>Javesella dubia</i> (KBM.)		?							?	X	X								?	?			
* <i>Javesella obscurella</i> (BOH.)		X																					
<i>Neophilaenus lineatus</i> (L.)	?					X	X	X	?	X	?				X	X							
<i>Anoscopus albifrons</i> (L.)					?	?	X		?														
<i>Anoscopus flavostriatus</i> (DON.)							X						X										X
* <i>Anoscopus serratae</i> (F.)						X							X										X
* <i>Zyginidia scutellaris</i> (H.-S.)	?		X	X				?	?			X	?	?	?	X	?	?	?	?	?		?
<i>Balclutha punctata</i> (F.)							?	X		X													?
* <i>Deltocephalus pulicaris</i> (FALL.)									?	X	X	X						X	X				?
<i>Recilia coronifer</i> (MARSH.)	X																						
<i>Doratura stylata</i> (BOH.)									X		?					X	X						?
<i>Grapocraerus ventralis</i> (FALL.)		?			?	?			?	?													X
<i>Elymana sulphurella</i> (ZETT.)									X		?												X
<i>Mocydia crocea</i> (H.-S.)	?				?				X														X
<i>Macustus grisescens</i> (ZETT.)	?											X	X										X
<i>Athysanus argentarius</i> METC.					X	X	X	X				X	X										X
<i>Conosanus obsoletus</i> (KBM.)					?									X									?
<i>Streptanus aemulans</i> (KBM.)					X			X															X
<i>Streptanus sordidus</i> (ZETT.)							?		X	X													
<i>Artianus interstitialis</i> (GERM.)									?	?													X
<i>Arocephalus longiceps</i> (KBM.)								X															
* <i>Psammotettix alienus</i> (DHLB.)			?	?	?					?	?								?	?			?
* <i>Ps. kolosvarensis</i> (MATS.)																							X
* <i>Ps. helvolus</i> (KBM.)					?		X		?	?								?					?
<i>Ps. nodosus</i> (RIB.)							X	?	?									?	?				
* <i>Ps. confinis</i> (DHLB.)			?					?	X	?				?		?	?	?	?	?			
* <i>Errastunus ocellaris</i> (FALL.)					?			X		?	X												X
<i>Turrutus socialis</i> (FL.)													?										
<i>Jassargus pseudocellaris</i> (FL.)									X		?												
<i>Verdanus abdominalis</i> (F.)								?	X	?													
* <i>Arthaldeus pascuellus</i> (FALL.)					X	?	X		X	?	X	X	X	X	X					?	?	?	X
<i>Enantiocephalus cornutus</i> (H.-S.)										?													X
<i>Mocuellus collinus</i> (BOH.)										?													X

Tab. 16: Übersicht der wichtigsten Zikadenarten an Poaceen im Wirtschaftsgrünland. * = auch in zwei- und mehrschürigen Düngewiesen.

Table 16: The most common Auchenorrhyncha species feeding on Poaceae in meadows and pastures. Asterisks indicate a pronounced tolerance to mowing (2 or more times a year) and fertilizing.

Die Verteilung der Zikaden wird wesentlich von der Feuchte und der Nutzungsart und -intensität beeinflusst. NICKEL & ACHTZIGER (1999) haben das Artenspektrum im Wirtschaftsgrünland aufgelistet und diskutiert. Demnach ist die Reaktion auf die Feuchte artspezifisch; die Anzahl xero-, meso- und hygrophiler Arten in der Grünlandfauna Mitteleuropas ist annähernd gleich hoch (bei

leichtem Überwiegen der letzteren). Die Reaktion auf die Nutzungsintensität ist jedoch bei den meisten Arten negativ. Nur einige wenige Pionierarten, die natürlicherweise v.a. auf wechsellückigen Schlammbänken an Fluss- und Seeufern und Salzwiesen leben, werden durch eine intensivere Nutzung offenbar begünstigt. Konventionelle Intensivwiesen und -weiden sind daher meist zikadenleer



21



22

Abb. 21-24:
Weit verbreitete Grünlandbesiedler: 21 - *Anoscopus flavostriatus* (DON.), 22 - *Anaceratagallia ribauti* (OSS.), 23 - *Delphacinus mesomelas* (BOH.) und 24 - *Eupelix cuspidata* (F.).

Figs 21-24:
Widespread species of managed grassland: 21 - *Anoscopus flavostriatus* (DON.), 22 - *Anaceratagallia ribauti* (OSS.), 23 - *Delphacinus mesomelas* (BOH.) and 24 - *Eupelix cuspidata* (F.).

oder werden nur von wenigen anspruchslosen Arten besiedelt. In diesen Fällen ist zudem nicht ganz sicher, ob solche Standorte überhaupt eine erfolgreiche Reproduktion ermöglichen oder ob hier lediglich eine Einwanderung aus benachbarten Lebensräumen mit Populationsüberschüssen erfolgt. Umgekehrt ist auf nicht oder nur wenig gedüngten, einschürigen Streuwiesen und Extensivweiden

die Zikadendiversität sehr hoch und kann über 30 oder gar 40 Arten pro Standort betragen. Allerdings werden solche Werte heute fast nur noch dort erreicht, wo wirtschaftlich unrentables Grünland aus Gründen der Landschaftspflege oder des Naturschutzes erhalten wird.

Eine zweite jährliche Mahd, welche i.d.R. auch mit höheren Düngergaben verbunden



23



24

ist, bewirkt bereits das Verschwinden zahlreicher Zikadenarten, die dann oft nur noch in Randbereichen, z.B. an Gräben und Rainen, überleben können. Solche gedüngten, zweischürigen Wiesen weisen dann nur noch ein verarmtes Artenspektrum auf (s. Tabelle 16). *Muellerianella fairmairei* (PERR.) ist der einzige Nährpflanzenspezialist, ansonsten dominieren Pionierarten und Generalisten, die meist ein breiteres Spektrum von Grasarten nutzen, oder an verschiedenen krautigen Dikotylen leben, wie *Anaceratagallia ribauti* (OSS.), *Aphrodes makarovi* ZACHV. und *Empoasca pteridis* (DHLB.), oder sowohl an Gräsern als auch Dikotylen, wie *Philaenus spumarius* (L.), *Macrosteles cristatus* (RIB.), *M. laevis* (RIB.), *M. sexnotatus* (FALL.), *M. viridigriseus* (EDW.), *Euscelis incisus* (KBM.) und *E. lineolatus* BR. (vgl. NICKEL & ACHTZIGER 1999).

Die Reaktion der Zikaden auf die Beweidung sind hingegen nur unzureichend bekannt. Die grundsätzlichen Mechanismen, insbesondere die negativen Einflüsse durch die Entfernung von Eigelegen und vermutlich die starken Schwankungen der mikroklimatischen Verhältnisse, dürften jedoch die selben sein. Allerdings werden bei einer extensiven Beweidung von 1-2 Großvieheinheiten pro Hektar nur wenige Arten ausgeschlossen, weil wegen des selektiven Frasses manche Pflanzenarten gemieden werden und weil an Geilstellen hochwüchsige Pflanzen stehen bleiben (HILDEBRANDT & NICKEL 2002). Dies gilt jedoch nicht für Rotations- und Umtriebsweiden.

Zikadengemeinschaften von Mähwiesen wurden beschrieben und diskutiert von ACHTZIGER et al. (1999), ANDRZEJEWSKA (1965), BORNHOLDT (1996), CHUDZICKA (1989), EMMRICH (1966), HAAS (1975), HILDEBRANDT (1995a), HILDEBRANDT & NICKEL (2002), MARCHAND (1953), NIKUSCH (1976), REMANE (1958), THARSEN (1987), WALOFF (1980), WALTER (1996, 1998). MORRIS (1981a, 1981b) und SOUTHWOOD & VAN EMDEN (1967) haben gezielt die Auswirkungen der Mahd untersucht; Düngungsversuche wurden von ANDRZEJEWSKA (1976), MORRIS (1992) und PRESTIDGE (1982) unternommen. Zu weiteren Aspekten der Grünlandfauna siehe ANDRZEJEWSKA (1979a, 1979b), CURRY

(1994), NOVOTNÝ (1994a, 1994b, 1995), PRESTIDGE & MCNEILL (1983) und TSCHARNTKE & GREILER (1995). WALOFF (1980) hat einen großen Teil des bis dahin vorliegenden Wissens über verschiedene Aspekte der Ökologie von Grünlandzikaden zusammengetragen und diskutiert.

3.2. Trocken- und Halbtrockenrasen

Mäßig trockene oder trockene Standorte auf wasserdurchlässigem Festgestein oder Lehm werden traditionell extensiv mit Schafen beweidet und weisen eine deutlich andersartige Zikadenfauna auf: die Mähwiesen auf. Viele Arten kommen auch auf sandigen Substraten vor; umgekehrt kommen psammophile Arten (Tabelle 7) gelegentlich auch auf Festgestein vor. Insgesamt lassen sich die Zönosen von Sandstandorten jedoch - trotz gewisser Überlappung - relativ gut abgrenzen und wurden bereits in Kap. 2.2 besprochen. Ebenso gibt es Arten, die zwar meistens auf Trockenrasen gefunden werden, die aber auch auf Feucht- und Bergwiesen vorkommen, wenn die Vegetation dort offen und kurzwüchsig ist, z.B. *Anakelisia perspicillata* (BOH.), *Delphacinus mesomelas* (BOH.) und *Doratura stylata* (BOH.).

Es dominieren meist die Besiedler von eher trockenheitsliebenden Gräsern (s. Tabelle 17), insbesondere von Schaf-Schwingel (*Festuca ovina*, incl. zahlreiche Kleinarten), Aufrechter Trespe (*Bromus erectus*) und Fieder-Zwenke (*Brachypodium pinnatum*). Lokal sind auch Hafer-Arten (*Helictotrichon* spp.), Federgräser (v.a. *Stipa capillata*), Blaugras (*Sesleria albicans*), Zittergras (*Briza media*), Wiesen-Rispe (*Poa pratensis* ssp. *angustifolia*) u.a. von Bedeutung. Dikotyle Nährpflanzen sind außerdem Fabaceen (*Genista*, *Ononis*, *Lotus* u.a.), Frühlings-Fingerkraut (*Potentilla tabernaemontani*), Heidekraut (*Calluna vulgaris*), Thymian (*Thymus* spp.) und Asteraceen (*Aster linosyris*, *Artemisia* spp., *Hieracium pilosella*, *Leontodon*, vermutlich auch *Cirsium*, *Carlina* u.a.); die Cyperaceae treten kaum in Erscheinung (Tabelle 18). Insbesondere unter den Gräsern werden wahrscheinlich auch weitere Arten besiedelt, sind aber bisher nicht oder

kaum untersucht (z.B. *Phleum* spp., *Koeleria* spp.). Unbekannt ist auch, ob die verschiedenen *Stipa*-Arten und *Festuca-ovina*-Kleinarten unterschiedlich genutzt werden.

Wo Gehölze aufwachsen, kommen weitere Zikadenarten hinzu, und zwar nicht nur die entsprechenden Arborikolen, sondern auch Saum- und Halbschattenbesiedler der Krautschicht (s. Kap. 1.2, Tabelle 2), stellenweise

auch Besiedler von Wäldern und feuchteren Standorten. Trockenrasen mit einzelnen Buschen und Bäumen gehören daher zu den zikadenartenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa überhaupt. Bei stärkerem Gehölzaufwuchs geht die Artenzahl jedoch wieder zurück, weil durch die Beschattung wärme- und trockenheitsliebende Krautschichtbesiedler ausgeschlossen werden.

Abb. 25-26: Charakteristische Arten von Trocken- und Halbtrockenrasen:
25 - *Asiraca clavicornis* (F.),
26 - *Dictyophara europaea* (L.)

Figs 25-26: Typical species of xerothermic grassland:
25 - *Asiraca clavicornis* (F.),
26 - *Dictyophara europaea* (L.).



25



26



27

Abb. 27-28: Charakteristische Arten von Trocken- und Halbtrockenrasen: 27 - *Neoaliturus fenestratus* (H.-S.) und 28 - *Neophilaenus albipennis* (F.).

Figs 27-28: Typical species of xerothermic grassland: 27 - *Neoaliturus fenestratus* (H.-S.) and 28 - *Neophilaenus albipennis* (F.).



28



Abb. 29:
Arten der Gattung *Tettigometra* sind sehr anspruchsvoll hinsichtlich der räumlichen Struktur ihrer Lebensräume; viele sind nur in versauften Trockenbiotopen zu finden. Im Bild: *Tettigometra macrocephala* FIEB.

Fig. 29:
Tettigometra species, e.g. *T. macrocephala* FIEB., show complex requirements concerning habitat structure landscapes; most of them are found along xerothermic margins of dry grassland.

Art	<i>Helictotrichon pratense</i>	<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Stipa</i> spp.	<i>Sesleria albicans</i>	<i>Briza media</i>	<i>Festuca ovina</i>	<i>Poa compressa</i>	<i>Poa pratensis</i>	<i>Bromus erectus</i>	<i>Brachypodium pinnatum</i>	<i>Elymus repens</i>
<i>Doratura horvathi</i> W.WG.	X										
<i>Ribautodelphax collinus</i> (BOH.)		X									
<i>Mocydiopsis parvicauda</i> RIB.		X									
<i>Doratura stylata</i> (BOH.)		X				X		?			
<i>Henschia acuta</i> (P. LÖW)			X*								
<i>Dudanus pallidus</i> DLAB.			X*								
<i>Praganus hofferi</i> (DLAB.)			?			?					
<i>Arocephalus languidus</i> (FL.)			X	X							
<i>Chlorionidea flava</i> P. LÖW				X							
<i>Zyginidia mocsaryi</i> (HORV.)				X							
<i>Psammotettix cephalotes</i> (H.-S.)					X						
<i>Acanthodelphax spinosus</i> (FIEB.)						X					
<i>Delphacinus mesomelas</i> (BOH.)						X					
<i>Eupelix cuspidata</i> (F.)						X					
<i>Arocephalus punctum</i> (FL.)						X					
<i>Jassidaeus lugubris</i> (SIGN.)			?			X					
<i>Metropis inermis</i> W.WG.						X					
<i>Metropis latifrons</i> (KBM.)						X					
<i>Metropis mayri</i> FIEB.						X					
<i>Kosswigianella exigua</i> (BOH.)						X					
<i>Neophilaenus infumatus</i> (HPT.)						X					
<i>Doratura exilis</i> HORV.						X					
<i>Rhytistylus proceps</i> (KBM.)						X					
<i>Hardya signifer</i> (THEN)						X					
<i>Rhopalopyx vitripennis</i> (FL.)						X					
<i>Mocydiopsis longicauda</i> REM.						X					
<i>Mendraeus pauxillus</i> (FIEB.)						X					
<i>Rhopalopyx preysleri</i> (H.-S.)								X			
<i>Mocydiopsis intermedia</i> REM.								X			
<i>Ditropsis flavipes</i> (SIGN.)									X		
<i>Turritus socialis</i> (FL.)						?*		X		?*	
<i>Ribautodelphax pungens</i> (RIB.)									X		
<i>Neophilaenus albipennis</i> (F.)									X		
<i>Adarrus multinotatus</i> (BOH.)									X		
<i>Adarrus bellevoeyi</i> (PUT.)									X		
<i>Enantiocephalus cornutus</i> (H.-S.)		?									X
<i>Mocuellus collinus</i> (BOH.)		?					?				X
<i>Neophilaenus campestris</i> (FALL.)		?					?				?
<i>Jassargus obtusivalvis</i> (KBM.)									?	?	

Tab. 17:
Xero- und heliophile Zikaden an Gräsern auf Trocken- und Halbtrockenrasen. * = nach COOK (1996), EMEJANOV (1964).

Table 17:
Xerophilous and heliophilous Auchenorrhyncha species on Poaceae in dry grassland. * = after COOK (1996), EMEJANOV (1964).

SCHIEMENZ (1969) gibt einen breiten Überblick über Artenspektren, Dominanzverhältnisse, Phänologien und die Zoogeografie der Zikadenfauna verschiedener Trockenstandorte Ostdeutschlands. Weitere Trockenstandorte auf Festgestein bzw. feinkörnigeren Substraten wurden von BORNHOLDT (1991), BORNHOLDT & TAMM (1986), COBBEN & ROZEBOOM (1983), MALICKY (1977), MÜLLER

Auf Trockenrasen im Süden und Osten des Gebietes kommen noch zahlreiche weitere xerothermophile Arten hinzu, deren Areale vom Mittelmeergebiet oder von Asien her nach Mitteleuropa hineinreichen. Einzelheiten zu ihren Habitatansprüchen sind meist nicht bekannt.

Östliche und südöstliche Arten, die an Gräsern (oft *Stipa*, *Festuca*, *Elymus*) in step-

Tab. 18:
Xerophile Zikadenarten an weiteren Pflanzengruppen.

Table 18:
Xerophilous Auchenorrhyncha species on further plants (excluding Poaceae).
Column labels: species, food plants, distribution in central Europe.

Art	Nährpflanze	Verbreitung in Mitteleuropa
<i>Kelisia haupti</i> W.W.G.	<i>Carex humilis</i>	v.a. Mainfranken, Thüringen
<i>Asiraca clavicornis</i> (F.)	polyphag?	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Dictyophara europaea</i> (L.)	polyphag	nur Südhälfte
<i>Agalmatium flavescens</i> (OL.)	polyphag?	nur im Süden
<i>Falcioides apterus</i> (F.)	polyphag?	nur im äußersten Süden
<i>Hysteropterum</i> spp.	polyphag?	nur im Süden
<i>Cercopis intermedia</i> KBM.	polyphag	nur im äußersten Süden
<i>Utecha trivialis</i> (GERM.)	?	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Megophthalmus scabripennis</i> EDW.	?	nur im Süden
<i>Hephathus nanus</i> (H.-S.)	<i>Cirsium acaule</i> ?	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Anaceratagallia venosa</i> (GEOFFR.)	<i>Lotus</i> , <i>Hippocrepis</i>	weit verbreitet
<i>Macropsidius sahlbergi</i> (FL.)	<i>Artemisia campestris</i>	nur Osthälfte
<i>Batracomorpha irroratus</i> LEW.	<i>Helianthemum nummularium</i>	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Erythria aureola</i> (FALL.)	<i>Thymus</i> , <i>Calluna</i>	weit verbreitet
<i>Chlorita dumosa</i> (RIB.)	<i>Thymus</i> spp.	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Arboridia kratochvili</i> (LANG)	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Endemit Mitteleuropas
<i>Goniagnathus brevis</i> (H.-S.)	<i>Thymus</i> spp.	bis zum Nordrand der Mittelgebirge
<i>Neoaliturus fenestratus</i> (H.-S.)	<i>Leontodon</i> spp.	weit verbreitet
<i>Handianus ignoscus</i> (MEL.)	<i>Cytisus</i> spp.	nur Osten
<i>Handianus procerus</i> (H.-S.)	<i>Genista</i> ?	nur Südosten
<i>Stictocoris picturatus</i> (C. SHLB.)	<i>Ononis</i> , <i>Genista</i> u.a.	nicht im Nordwesten
<i>Ophiola transversa</i> (FALL.)	<i>Achillea millefolium</i>	v.a. Nordosten
<i>Laburris impictifrons</i> (BOH.)	<i>Artemisia campestris</i>	v.a. Osthälfte
<i>Laburris pellax</i> (HORV.)	<i>Aster linosyris</i>	nur Südhälfte
<i>Euscelis venosus</i> (KBM.)	<i>Carlina</i> spp.?	v.a. Alpen und Kalkgebiete

(1978), MUSIL (1958), PETER (1981), POSTPLANGG & HOFFMANN (1982), ROMBACH (1999), SCHIEMENZ (1971b, 1973), SCHWOERBEL (1957) und WITSACK (1999) bearbeitet.

Wie Zikadenarten auf Schafbeweidung reagieren, wurde bisher nur von MORRIS (1971, 1973) auf englischen Halbtrockenrasen untersucht. Demnach werden lichtliebende Arten, wie *Anaceratagallia venosa* (GEOFFR.), *Aphrodes bicincta* (SCHRK.), *Arocephalus punctum* (FL.), *Rhytistylus proceps* (KBM.) und *Eupteryx notata* CURT. gefördert, eher eurytope Hochgrasbesiedler, wie *Stenocranus minutus* (F.), *Anoscopus flavostriatus* (DON.) und *Strepitanus aemulans* (KBM.), aber auch *Arboridia parvula* (BOH.), zurückgedrängt. Die Reaktion dürfte aber stark von der Intensität (Besatzdichte, Anzahl der Umtriebe), dem Modus (Dauer-/Umtriebsweide) und dem Zeitpunkt der Beweidung abhängen, worüber jedoch keine Einzelheiten bekannt sind.

penartigen Lebensräumen vorkommen, sind u.a. *Stiromoides maculiceps* (HORV.), *Horvathianella palliceps* (HORV.), *Falcoya minuscula* (HORV.), *Trypetimorpha occidentalis* HNG. & BRGN., *Dorycephalus baeri* KOUCH., *Paradorydium paradoxum* (H.-S.), *Glossocratus foveolatus* FIEB., *Hecalus glaucescens* (FIEB.), *Recilia horvathi* (THEN), *Doratura concors* HORV., *D. heterophylla* HORV., *Aconurella quadrum* (H.-S.), *Hardya anatolica* ZACHV., *Pantallus alboniger* (LETH.), *Psammotettix inexpectatus* REM., *Philaia jassargiforma* DLAB., *Pleargus pygmaeus* (HORV.), *Diplocolenus nigrifrons* (KBM.), *D. frauenfeldi* (FIEB.), *Emeljanovianus medius* (M. & R.), *Chloothea zonata* EM., *Rhoananus hypochlorus* (FIEB.) und *Mocuellus quadricornis* DLAB. Einige dieser Steppenarten kommen nur reliktiert in trockenen Regionen der Zentral- und Westalpen vor und besiedeln dort die hochmontane bis subalpine Stufe, oft auf wasserdurchlässigem Gestein und in Südexposition.

Nach bisheriger Datenlage gehören *Mongolajassus alpinus* DELLA GIUSTINA, *M. servadeimus* (DLAB.), *Bobacella corvina* (HORV.) und *Ribautodelphax ochreateus* VILB. in diese Gruppe (D'URSO & REMANE 1994; REMANE & FRÖHLICH 1994b; WAGNER & FRANZ 1961). Steppearten, die an Dikotylen leben, sind u.a. *Hephathus achilleae* MITJ., *Chlorita* (s.l.) spp. und *Micantulina stigmatipennis* (M. & R.).

3.3. Ruderalstellen und Brachen

Je nach Alter und Standort können Ruderalstellen und Brachen von den verschiedensten Zikadenarten besiedelt werden. Hier soll jedoch nur auf frühe, bis etwa fünfjährige Stadien der Sekundärsukzession auf Standorten mittlerer Feuchte- und Nährstoffverhältnisse eingegangen werden. In weiten Teilen Mitteleuropas tritt hier eine kleine Gruppe von 11 Arten als die Hauptkolonisatoren auf (Tabelle 19). Die meisten sind ausgesprochen eurytop und kommen auch im intensiv genutzten Wirtschaftsgrünland und auf anderen Offenland-Standorten vor (vgl. Kap. 3.1). Aufgrund ihrer von Polyphagie, Langflügeligkeit, hoher Reproduktionsrate (bisher allerdings nur als jährliche Generationenzahl messbar) und weiter Verbreitung, die in Kombination als „Kolonisationssyndrom“ bezeichnet wurde, sind sie v.a. auf primären und sekundären Sukzessionsstandorten häufig und dominant (DENNO 1994; DENNO et al. 1991; NOVOTNÝ 1994a, 1994b, 1995).

In Tabelle 19 sind die wichtigsten Pionierarten und ihre Lebensstrategien aufgelistet. Die meisten sind polyphag. Nur *Zyginidia scutellaris* (H.-S.), *Psammotettix alienus* (DHLB.) und *P. confinis* (DHLB.) sind auf (allerdings zahlreiche) Poaceen-Arten beschränkt. Monophage sind nicht vertreten. Alle Arten sind ausschließlich oder vorwiegend langflügelig, nur bei *Laodelphax striatellus* (FALL.), *Javesella pellucida* (F.) und *Psammotettix confinis* (DHLB.) treten gelegentlich und meist in geringer Zahl kurzflügelige Individuen auf. Mit Ausnahme der zumindest am nördlichen Arealrand univoltinen *Zyginidia scutellaris* (H.-S.) handelt es sich ausschließlich um mindestens bivoltine Arten. Ihre Areale erstrecken sich meist über weite Teile der Paläarktis; Ausnahmen sind nur die vorwiegend mediterrane *Zyginidia scutellaris* (H.-S.) und der

europäische *Macrosteles viridigriseus* (EDW.). Über die Bedeutung der Überwinterungsform für die Kolonisationsfähigkeit ist derzeit nur wenig bekannt. Sie spielt vermutlich nur eine geringe Rolle, da in den jeweiligen Teilgruppen die ohnehin am weitesten verbreiteten Überwinterungsstadien überwiegen, nämlich die Larve bei den Delphacidae und das Ei bei den Cicadellidae.

Eine Gruppe von weiteren Arten, die ebenfalls als Kolonisatoren, wenn auch meist nicht ganz so schnell, auftreten können, enthält bereits mehr Nährpflanzenspezialisten und vorwiegend Brachyptere und Univoltine (Tabelle 19).

NOVOTNÝ (1994a, 1994b, 1995) hat anhand der Zikadenfauna zeitweise trockengefallener Teichböden und anderer Lebensräume das Problem ausführlich diskutiert. Artgemeinschaften von Ruderalstandorten wurden außerdem dargestellt und diskutiert von FUNKE & WITSACK (1998), HAHN (1996), HILDEBRANDT (1986) und SCHIEMENZ (1964). In England haben HOLLIER et al. (1994) und MORRIS (1990) die Kolonisation von neu eingesäten Grünflächen untersucht.

Tab. 19: Typische Besiedler von Ruderalstellen und Brachen und ihre Lebensstrategien (NB = Nahrungsbreite: mon-1 = monophag 1. Grades, mon-2 = monophag 2. Grades, oli-1 = oligophag 1. Grades, oli-2 = oligophag 2. Grades, pol = polyphag (s. Kap. 1.1); FL = Flügellänge: m = makropter, d(m/b) = dimorph, mit überwiegend makropteren/brachypteren Individuen; Gen = Generationenzahl pro Jahr; ÜW = Überwinterungsstadium: Lv = Larve, Ad = Adult).

Table 19: Characteristic Auchenorrhyncha species of ruderal habitats and fallows and their life strategies. Column labels and abbreviations: species, NB = food plant range (mon-1 = strictly monophagous on one plant species, mon-2 = monophagous on one plant genus, oli-1 = oligophagous on one plant family, oli-2 = feeding on plant species of two families or not more than four genera of not more than four families, pol = polyphagous); FL = wing length (m = macropterous, d(m/b) = dimorphic with dominating brachypterous/macropterous individuals); Gen = number of generations per year; distribution, ÜW = hibernating stage (Lv = nymph, Ad = adult, Ei = egg).

Art	NB	FL	Gen	Verbreitung	ÜW
Typische Pionierarten					
<i>Laodelphax striatellus</i> (FALL.)	pol?	d(m)	2	paläarktisch	Lv
<i>Javesella pellucida</i> (F.)	pol?	d(m)	2	paläarktisch	Lv
<i>Empoasca pteridis</i> (DHLB.)	pol	m	2?	westpaläarktisch	Ei?
<i>Zyginidia scutellaris</i> (H.-S.)	oli-1	m	1?	mediterran	Ad
<i>Macrosteles cristatus</i> (RIB.)	pol	m	2	eurosibirisch	Ei
<i>Macrosteles laevis</i> (RIB.)	pol	m	2	paläarktisch?	Ei
<i>Macrosteles quadripunctulatus</i> (KBM.)	pol?	m	2	paläarktisch?	Ei
<i>Macrosteles sexnotatus</i> (FALL.)	pol	m	2	paläarktisch	Ei
<i>Macrosteles viridigriseus</i> (EDW.)	oli-2?	m	2	europäisch	Ei
<i>Psammotettix alienus</i> (DHLB.)	oli-1	m	2	paläarktisch	Ei
<i>Psammotettix confinis</i> (DHLB.)	oli-1	d(m)	2	eurosibirisch	Ei
Weitere Arten					
<i>Dicranotropis hamata</i> (BOH.)	oli-1	d(b)	1-2	paläarktisch	Lv
<i>Toya propinqua</i> (FIEB.)	oli-1?	d	2?	kosmopolitisch	Lv
<i>Javesella obscurella</i> (BOH.)	oli-1?	d(b)	2	paläarktisch	Lv
<i>Ribautodelphax albostriatum</i> (FIEB.)	mon-1	d(b)	2	westpaläarktisch	Lv
<i>Megophthalmus scanicus</i> (FALL.)	oli-1	d(b)	1	mediterran	Ei
<i>Anacratagallia venosa</i> (GEOFFR.)	oli-2?	d(b)	1	eurosibirisch?	Ei
<i>Aphrodes makarovi</i> ZACHV.	pol	d(b)	1	europäisch?	Ei
<i>Macrosteles frontalis</i> (SCOTT)	mon-2	m	(1-?)2	eurosibirisch	Ei
<i>Macrosteles quadripunctulatus</i> (KBM.)	pol?	m	2	paläarktisch?	Ei
<i>Doratura homophyla</i> (FL.)	oli-1	d(b)	2	paläarktisch	Ei
<i>Euscelidius schenckii</i> (KBM.)	pol	m	1	westpaläarktisch	Ei
<i>Euscelidius variegatus</i> (KBM.)	pol	m	1	westpaläarktisch	Ei
<i>Euscelis incisus</i> (KBM.)	oli-2	d(b)	1-2	paläarktisch	Lv/Ei
<i>Ophiola decumana</i> (KONTK.)	oli-1?	m	2	eurosibirisch?	Ei
<i>Psammotettix nodosus</i> (RIB.)	oli-1	m	2	europäisch	Ei
<i>Arthaldeus pascuillus</i> (FALL.)	oli-1	d(b)	2	eurosibirisch	Ei

3.4. Feldkulturen

Einjährige Kulturen erfahren durch Ernte, Bodenbearbeitung, Düngung und meist auch Pestizidausbringung massive Störungen. Damit ist im allgemeinen eine periodische und vollständige Entfernung bzw. Zerstörung der Nähr- und Eiablagepflanzen verbunden, wodurch der allergrößte Teil der Zikadenarten von vorneherein dauerhaft ausgeschlossen ist. Nur wenige sind in der Lage, nach Aufwachsen der Vegetation rasch einzuwandern und allenfalls eine Sommergeneration aufzubauen. Aufgrund ihrer Lebensstrategien kommen daher prinzipiell nur die in Kap. 3.3 genannten Arten für eine Besiedlung in Frage, also vorwiegend weit verbreitete, polyphage, lang-flügelige und mindestens bivoltine. Fallstudien wurden vorgelegt von AFSCHARPOUR (1960), EMMRICH (1966), GEILER (1963) und GARBARCZYK (1987). In Finnland haben RAATIKAINEN (1967, 1971, 1972) und RAATIKAINEN & VASARAINEN (1971, 1976) intensiv die Neubesiedlung von Getreidefeldern untersucht.

Bei stärkerem Einflug können Schädigungen an den Kulturpflanzen durch Übertragung von Pflanzenkrankheiten (v.a. Virosen und Mykoplasmosen) und durch die Saugtätigkeit auftreten. Allerdings sind in den letzten Jahren nur noch sehr wenige solcher Fälle bekannt geworden. So überträgt *Psammotettix alienus* (DHLB.) in Ostdeutschland das Weizenverzweigungsvirus (WDV) auf Gerste (MANURUNG et al. 2001), und *Empoasca decipiens* PAOLI verursacht direkte Saugschäden an Gurken und Paprika in Gewächshäusern am Bodensee (SCHMIDT & RUPP 1997). In Burgund steht neuerdings auch eine noch nicht näher identifizierte *Pentastiridius*-Art im Verdacht, eine Mykoplasrose auf Zuckerrüben zu übertragen (GATINEAU et al. 2001).

Dauerkulturen bieten den Zikaden aufgrund der weniger intensiven Störung bessere Lebensbedingungen. Dennoch sind auch hier in den vergangenen Jahren nur noch wenige Schadensfälle aufgetreten, mit Ausnahme von Weinbergen, wo *Empoasca vitis* (GÖTTE) Saugschäden verursacht (HERRMANN et al. 1999; LOUIS & SCHIRRA 1997; SCHRUFFT & WEGNER-KIB 1999) und *Hyalesthes obsoletus* SIGN. die Vergilbungskrankheit überträgt (WEBER & MAIXNER 1998). Schäden können

außerdem durch die Eiablage größerer Arten in junge Zweige verursacht werden. Dies wurde z.B. bei *Stictocephala bisonia* KOPP & YOUKE und *Cicadella viridis* (L.) beobachtet.

BRČÁK (1979) hat eine Übersicht über weitere Fälle von Schäden an Kulturpflanzen durch Zikaden zusammengestellt. Allerdings wurde die Fähigkeit zur Krankheitsübertragung oft nur unter Laborbedingungen nachgewiesen. Dass die entsprechenden Arten tatsächlich auch eine Rolle als Vektoren in der Praxis spielen, konnte nur in wenigen Fällen nachgewiesen werden oder wurde gar nicht untersucht. Eine weitere Fehlerquelle insbesondere in der älteren Literatur ist die Annahme, dass alle auf den untersuchten Flächen gefundenen Zikadenarten auch an den Kulturpflanzen und nicht etwa an Unkräutern saugen. Der seit Jahrzehnten übliche intensive Einsatz von Herbiziden hat aber die Unkräuter stark reduziert, so dass das Auftreten von Zikaden an Kulturpflanzen insgesamt wahrscheinlich zurückgegangen ist. Allerdings ist es in der Zukunft durchaus möglich, dass aufgrund der opportunistischen Lebensstrategien der in Frage kommenden Zikadenarten nach Umstellungen in der Landbewirtschaftung neue Problemfälle entstehen, ebenso durch Neueinwanderung oder Einschleppung von Neozoen, z.B. der nordamerikanischen Flatide *Metcalfa pruinosa* (SAY), die im Mittelmeergebiet seit einigen Jahren erhebliche Saugschäden an den verschiedensten Kulturpflanzen verursacht und sich rasch ausbreitet (z.B. ALDINI et al. 1998; DELLA GIUSTINA & NAVARRO 1993; HOLZINGER et al. 1996).

Danksagung

Für Hinweise zur Lebensweise einiger südlicher und südöstlicher Arten danken wir den Herren Dr. Pavel Lauterer, Brünn, und Prof. Dr. Reinhard Remane, Marburg. P. Lauterer nahm eine kritische Durchsicht des Manuskriptes vor.

Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wird für die Gewährung eines APART (Austrian Programme for Advanced Research and Technology)-Stipendiums an W. Holzinger herzlich gedankt.

Zusammenfassung

Basierend auf eigenen Daten und einer Literaturobseruation wird eine Übersicht über die Habitate der mitteleuropäischen Zikadenfauna gegeben. Besiedelt werden nahezu alle semiaquatischen und terrestrischen Lebensräume von Schwimmblattgürteln und Röhrrichen bis hin zum Trockenrasen und vom Mineralboden bis in die Baumkronen hinauf. 61% der Arten leben permanent in der Krautschicht, rund 27% in der Baum- und Strauchschicht. Rund 11% bewohnen mehrere Straten, der Großteil davon macht einen obligaten Wechsel durch, meist vom Boden oder von der Krautschicht in die Baumschicht. Als Nährpflanzen spielen krautige Monokotyle und Gehölze mit Abstand die wichtigste Rolle. Von weitaus geringerer Bedeutung sind krautige Dikotyle und Zwergsträucher. Von jeweils nur einzelnen Zikaden-Arten werden Farnpflanzen, Gymnospermen und Pilze genutzt. Generell sind die höchsten Artenzahlen auf biomassereichen, also hochwüchsigen oder weit verbreiteten und häufigen Pflanzenarten anzutreffen.

Wichtige Habitatfaktoren für einen Großteil der Arten sind Feuchte, Störung und die oftmals spezifischen Nährpflanzen. Weiterhin können Temperatur, Sonnenexposition, pH-Wert und Nährstoffgehalt des Bodens, Meereshöhe, Bodeneigenschaften und Salinität eine Rolle spielen, sind aber z.T. miteinander korreliert. Dementsprechend gibt es besonders spezialisierte Zikadenarten in Lebensräumen, in denen extreme Verhältnisse hinsichtlich dieser Faktoren herrschen, also Ufer, Moore, Trockenrasen, Dünen, Salzwiesen und alpine Matten. In stark gestörten Lebensräumen kommen nur noch wenige eurytope, polyphage und gut flugfähige Arten mit hohem Fortpflanzungspotential vor. Eine Ausnahme hiervon bilden allerdings die regelmäßig überfluteten Kiesbänke der Alpenflüsse, die trotz intensiver Störung eine Anzahl stenotoper, monophager und monovoltiner Arten, oft mit nur eingeschränkter Flugfähigkeit, aufweisen.

Literatur

- ACHTZIGER R., NICKEL H. & R. SCHREIBER (1999): Auswirkungen von Extensivierungsmaßnahmen auf Zikaden, Wanzen, Heuschrecken und Tagfalter im Feuchtgrünland. — Schr.-R. Bayer. Landesamt Umweltschutz **150**: 109-131
- AFSCHARPOUR F. (1960): Ökologische Untersuchungen über Wanzen und Zikaden auf Kulturfeldern in Schleswig-Holstein. — Z. angew. Zool. **47**: 257-301.
- ALDINI R.N., GUARDIANI M.C. & P. CRAVEDI (1998): Faunistic notes on the hoppers (Homoptera Auchenorrhyncha) in vineyards in the province of Piacenza. — Boll. Zool. Agr. Bach. **30**(1): 61-68.
- AMBSDORF J. (1996): Phytophage Arthropoda in verschiedenen Erlenbeständen (*Alnus glutinosa*) der Bornhöveder Seenkette unter besonderer Berücksichtigung des Kronenraumes. — Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. **20**: 77-110.
- ANDRZEJEWSKA L. (1965): Stratification and its dynamics in meadow communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). — Ekologia Polska **13**: 685-715.
- ANDRZEJEWSKA L. (1971): Productivity investigations of two types of meadows in the Vistula valley. VI. Production and population density of leafhopper (Homoptera - Auchenorrhyncha) communities. — Ekol. Polska **19**: 151-172.
- ANDRZEJEWSKA L. (1976): The effect of mineral fertilization of a meadow on the Auchenorrhyncha (Homoptera) fauna. — Pol. Ecol. Stud. **2**(4): 111-127.
- ANDRZEJEWSKA L. (1979a): Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems. I. Herbivores in natural and managed meadows. — Pol. Ecol. Stud. **5**(4): 5-44.
- ANDRZEJEWSKA L. (1979b): Herbivorous fauna and its role in the economy of grassland ecosystems. II. The role of herbivores in trophic relationships. — Pol. Ecol. Stud. **5**(4): 45-76.
- ANDRZEJEWSKA L. (1991): Formation of Auchenorrhyncha communities in diversified structures of agricultural landscape. — Pol. ecol. Stud. **17**: 267-287.
- ARZONE A. & C. VIDANO (1987): Typhlocybinæ of broad-leaved trees and shrubs in Italy. 3. Corylaceæ. — Boll. Inst. Ent. Univ. Bologna **41**: 269-276.
- BITTNER C. & R. REMANE (1977): Beiträge zur Kenntnis der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadina) des Roten Moores/Rhön. — Beitr. Naturk. Osthessen **11/12**: 141-162.
- BORNHOLDT G. (1991): Auswirkungen der Pflegemaßnahmen Mahd, Mulchen, Beweidung und Gehölzrückschnitt auf die Insektenordnungen Orthoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha und Coleoptera der Halbtrockenrasen im Raum Schlüchtern. — Marburger ent. Publ. **2** (6): 1-330.
- BORNHOLDT G. (1996): Die Zikadenfauna unterschiedlich gepflegter Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen in der Hohen Rhön. — Ber. 2. Auchenorrhyncha-Tagung 15.9.-17.9.1995 in Marburg: 5-14.

- BORNHOLDT G. & R. REMANE (1993): Veränderungen im Zikadenartenbestand eines Halbtrockenrasens in der Eifel (Rheinland-Pfalz) entlang eines Nährstoffgradienten. — *Z. Ökol. Natursch.* **2**: 19-29.
- BORNHOLDT G. & J. TAMM (1986): Zur Wanzen- und Zikadenfauna einiger Trockenhänge bei Schlüchtern (Osthessen). — *Hess. faun. Briefe* **6**: 12-29.
- BRČÁK J. (1979): Leafhopper and planthopper vectors of plant disease agents in central and southern Europe. — In: MARAMOROSCH K. & K.F. HARRIS (eds.): *Leafhopper vectors and plant disease agents*. Academic Press, New York. pp. 97-154.
- BRÖRING U. & R. NIEDRINGHAUS (1989a): Die epigäische Hemipterenfauna (Heteroptera, Auchenorrhyncha) der Tertiärdünen Ostfriesischer Düneninseln. — *Braunschw. naturkd. Schr.* **3**: 387-397.
- BRÖRING U. & R. NIEDRINGHAUS (1989b): Veränderungen der Wanzen- und Zikadenfauna innerhalb von 50 Jahren auf der ostfriesischen Insel Borkum (Hemiptera: Heteroptera, Geocorisae; Auchenorrhyncha). — *Oldenburger Jb.* **89**: 337-356.
- BÜCHS W. (1988): Stamm- und Rindenzoozönosen verschiedener Baumarten des Hartholzauenwaldes und ihr Indikatorwert für die Früherkennung von Baumschäden. — *Dissertation Univ. Bonn*. 813 S.
- CERUTTI N. (1939): Les Typhlocyidae du Valais. — *Bull. Murithienne* **56**: 81-95.
- CHRISTANDL-PESKOLLER H. & H. JANETSCHKE (1976): Zur Faunistik und Zoozönotik der südlichen Zillertaler Hochalpen. — *Veröff. Univ. Innsbruck* **7** (101): 1-134.
- CHUDZICKA E. (1986): Structure of leafhopper (Homoptera, Auchenorrhyncha) communities in the urban green of Warsaw. — *Memorabilia Zool.* **42**: 67-99.
- CHUDZICKA E. (1989): Leafhoppers (Homoptera, Auchenorrhyncha) of moist meadows on the Mazovian lowland. — *Memorabilia Zool.* **43**: 93-118.
- CLARIDGE M.F. & M.R. WILSON (1976): Diversity and distribution pattern of some mesophyll-feeding leafhoppers of temperate woodland canopy. — *Ecol. Ent.* **1**: 231-250.
- CLARIDGE M.F. & M.R. WILSON (1981): Host-plant associations, diversity and species-area relationships of mesophyll-feeding leafhoppers of trees and shrubs in Britain. — *Ecol. Ent.* **6**: 217-238.
- COBBEN R.H. & G.J. ROZEBOOM (1983): De invertebratenfauna van de Zuidlimburgse kalkgraslanden. De Cicaden in bodemvallen (Hemiptera, Homoptera Auchenorrhyncha). — *Natuurhist. Maandbl.* **72**(6/7): 102-110.
- CURRY J.P. (1994): Grassland invertebrates. — Chapman & Hall, London. 437 pp.
- DENNO R.F. (1994): Life history variation in planthoppers. In: DENNO R.F. & T.J. PERFECT (eds.): *Planthoppers: their ecology and management*. — Chapman & Hall, New York. pp. 163-215.
- DENNO R.F. & J.T. PERFECT (1994): Planthoppers: Their ecology and management. — Chapman and Hall, New York.
- DENNO R.F., McCLURE M.S. & J.R. OTT (1995): Interspecific interactions in phytophagous insects: competition reexamined and resurrected. — *Annu. Rev. Ent.* **40**: 297-331.
- DENNO R.F., RODERICK G.F., OLMSTEAD K.L. & H.G. DOBEL (1991): Density-related migration in planthoppers (Homoptera: Delphacidae): the role of habitat persistence. — *Am. Nat.* **138**: 1513-1541.
- DOBLER G. (1985): Abundanzdynamik und Entwicklungszyklen von Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) im zentralalpiner Hochgebirge. — *Veröff. Univ. Innsbruck* **148**, *Alpin-biol. Stud.* **XVIII**: 1-111.
- DROSOPOULOS S., ASCHE M. & H. HOCH (1986): Contribution to the planthopper fauna of Greece (Homoptera, Auchenorrhyncha, Fulgoromorpha, Delphacidae). — *Anns. Inst. phytopath. Benaki (N.S.)* **14**: 19-68.
- D'URSO V. & R. REMANE (1994): Remarks on some separated, peripheric and relictary West European populations of the Asiatic genus *Mongolojassus* ZACHVATKIN: taxonomy and distribution. — *Mem. Soc. ent. ital., Genova* **72**: 35-48.
- ELLENBERG H. (1996): *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht*. — 5. Aufl., Ulmer, Stuttgart.
- EMMRICH R. (1966): Faunistisch-ökologische Untersuchungen über die Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) von Grünland-Flächen und landwirtschaftlichen Kulturen des Greifswalder Gebietes. — *Mitt. Zool. Mus. Berlin* **42**: 61-126.
- EMMRICH R. (1969): Bodenfallenfänge von Zikaden aus nordostdeutschen Laub- und Kiefern-Mischwäldern. — *Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden* **2**: 279-29.
- FÖRSTER H. (1960): Zur Zikadenfauna der Oberlausitz (Hemiptera - Homoptera). I. Typhlocyidae. — *Natura lusatica, Beitr. Erforsch. Lausitz* **5**: 61-72.
- FRÖHLICH W. (1997a): Nährpflanzen- und Habitatnutzung salzstellenbesiedelnder Zikadenarten (Auchenorrhyncha) in Deutschland. — *Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent.* **11**: 905-909.
- FRÖHLICH W. (1997b): Zur Salzverträglichkeit einiger Zikadenarten mitteleuropäischer Salzwiesen. — *Beitr. Zikadenkde.* **1**: 17-33.
- FROHNE D. & U. JENSEN (1998): Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. — 5. Aufl. Wiss. Verlagsges., Stuttgart. 371 pp.
- FUNKE T. & W. WITSACK (1998): Zur Zikadenfauna der Bergbaufolgelandschaft ehemaliger Braunkohletagebaue in Sachsen-Anhalt (Homoptera, Auchenorrhyncha) - vorläufige Bestandsliste. — *Beitr. Zikadenkde.* **2**: 39-51.
- GARBARCZYK M. (1987): Leafhoppers (Homoptera, Auchenorrhyncha) and their parasitoids on rye crops with different surroundings. — *Pol. Ecol. Stud.* **13**(2): 195-213.

- GATINEAU F., LARRUE J., CLAIR D., LORTON F., RICHARD-MOLARD M. & E. BOUDON-PADIEU (2001): A new natural planthopper vector of stolbur phytoplasma in the genus *Pentastiridius* (Hemiptera: Cixiidae). — Eur. J. Plant Path. **107**: 263-271.
- GEBICKI C. & J. SZWEDO (1991): *Speudotettix montanus* sp. nov. (Homoptera, Cicadellidae) from Bieszczady. — Acta Biol. Silesiana **18**(35): 17-21.
- GEILER H. (1963): Artenlisten der Wanzen und Zikaden von Feldern sowie deren Abundanz und Aktivitätsdichte während einzelner Jahre mit unterschiedlichem Witterungsverlauf. — Wiss. Z. TU Dresden **12**(2): 543-549.
- GIUSTINA W. DELLA (1989): Homoptères Cicadellidae. Vol. 3. Compléments aux ouvrages d'Henri Ribaut. — Faune de France **73**, Paris.
- GIUSTINA W. DELLA & E. NAVARRO (1993): *Metcalfa pruinosa*, un nouvel envahisseur? — Phytoma - La défense des végétaux **45**1: 30-32.
- GRAVESTAIN W.H. (1965): New faunistic records on Homoptera - Auchenorrhyncha from Netherlands North Sea island Terschelling. — Zool. Beitr., N.F. **11**: 103-111.
- GÜNTART H. (1971): Kleinzikaden (Typhlocybinæ) an Obstbäumen in der Schweiz. — Schweiz. Z. Obst- u. Weinbau **107**: 285-306.
- GÜNTART H. (1984): Zikaden aus der alpinen Höhenstufe der Schweizer Zentralalpen. — Mitt. Schweiz. ent. Ges. **57**: 129-130.
- GÜNTART H. (1987): Ökologische Untersuchungen im Unterengadin. Zikaden (Auchenorrhyncha). — Ergeb. wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark **12**(12): 203-299.
- GÜNTART H. (1997): Die Zikaden des Schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung (Insecta: Auchenorrhyncha). — Nationalpark-Forschung in der Schweiz **88**: 1-33.
- GYÖRFFY G. (1980): Auchenorrhyncha of the upper terrain of a sand soil grassland: quantitative relations, biotic and ecological-valence data. — Acta biol. Szeged **26**: 137-142.
- GYÖRFFY G. (1982): Auchenorrhyncha of a sandy soil mosaic-grassland: Quantitative relations, biotic and ecological valence data. — Folia entomol. Hungarica **43**: 43-54.
- GYÖRFFY G. & E. ABDAI (1996): Auchenorrhyncha assemblages of the „Asóthalmi Láprét“ Nature Conservation Area in Hungary I. — Acta biol. Szeged **41**: 57-65.
- GYÖRFFY G. & I. KINCSEK (1986): The Cicadinea fauna of sodic zonation at the southern lowlands. — Acta biol. Szeged **32**: 157-174.
- GYÖRFFY G. & T. POLLÁK (1983): Habitat specialization of leafhopper community living in a sandy soil grassland. — Folia entomol. Hungarica **43**: 43-54.
- HAAS H. (1975): Die Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) einer Wiese und ihr Energieumsatz. — Dissertation Univ. Göttingen. 63 S.
- HAHN S. (1996): Zur Dynamik der Heuschrecken- und Zikadenfauna am Sukzessionsbeginn auf unterschiedlich bewirtschafteten Brachflächen, Altbrachen und naturnahen Flächen im NSG „Porphyrlandschaft bei Gimritz“ nordwestlich von Halle/Saale (Saltatoria, Auchenorrhyncha). — Diss. Universität Halle/S., 99 pp.
- HAUPT H. & H. HEDICKE (1934): Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). — Märk. Tierw., Berlin **1**: 41-48.
- HELLER F. (1975): *Adarrus ocellaris* (FALL.) ssp. *tatraensis* ssp. nova (Homoptera, Cicadellidae). — Stuttgarter Beitr. Naturk. A, Nr. **288**: 1-3.
- HELLER F. (1987): Faunistische Untersuchungen im Feuchtgebiet „Unterer See“ bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg). 5. Auchenorrhyncha, Zikaden. — Mitt. ent. Ver. Stuttgart **22**: 76-92.
- HERRMANN J., EICHLER P. & K. GUEDOVA (1999): Natürlichen Feinden auf der Spur. — Das deutsche Weinmagazin **11**: 33-36.
- HEYDEMANN B., GÖTZE W. & U. RIECKEN (1994): Ökologische Analyse der Fauna des NSG „Barker Heide“ — Faun.-ökol. Mitt., Suppl. **16**: 13-47.
- HIEBSCH H., EMMRICH R. & R. KRAUSE (1978): Zur Fauna einiger Arthropodengruppen des Flächennaturdenkmals „Saugartenmoor“ in der Dresdener Heide. — Ent. Abh. Mus. Tierkde. Dresden **42**: 211-249.
- HILDEBRANDT J. (1986): Besiedlung eines Ruderal-Ökosystems durch Zikaden. — Drosera **86**(1): 15-20.
- HILDEBRANDT J. (1990): Terrestrische Tiergemeinschaften der Salzwiesen im Ästuarbereich. — Dissertation Univ. Bremen. 290 S.
- HILDEBRANDT J. (1995a): Zur Zikadenfauna im Feuchtgrünland - Kenntnisstand und Schutzaspekte. — Mitt. 1. Auchenorrhyncha-Tagung Halle/S. 1994: 5-22.
- HILDEBRANDT J. (1995b): Untersuchungen zur Zikadenfauna (Hemiptera: Auchenorrhyncha) einer Ästuarwiese unter dem Einfluß landwirtschaftlicher Nutzung und veränderten Überflutungsgeschehens. — Faun.-Ökol. Mitt. **7**: 9-45.
- HILDEBRANDT J. & H. NICKEL (2002, eingereicht): Auchenorrhyncha communities as indicators of disturbance in grasslands (Insecta, Hemiptera) - A case study from the middle Elbe valley (North Germany). — Agriculture, Ecosystems and Environment.
- HOFFMANN B. (1980): Vergleichend ökologische Untersuchungen über die Einflüsse des kontrollierten Brennens auf die Arthropodenfauna einer Riedwiese im Federseegebiet (Südwestwürttemberg). — Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **51/52**(2): 691-714.
- HOLLIER J.A., BROWN V.K. & G. EDWARDS-JONES (1994): Successional leafhopper assemblages: patterns and process. — Ecological Research **9**: 185-191.
- HOLZINGER W.E. (1996a): Kritisches Verzeichnis der Zikaden Österreichs (Ins.: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Carinthia II **186/106**: 501-517.

- HOLZINGER W.E. (1996b): Die Zikadenfauna wärmeliebender Eichenwälder Ostösterreichs (Insecta: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark **126**: 169-187.
- HOLZINGER W.E. (1999a): Rote Liste der Zikaden Kärntens (Insecta: Auchenorrhyncha). — In: ROTTENBURG T., WIESER C., MILDNER P. & W.E. HOLZINGER (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Kärntens. Naturschutz in Kärnten **15**: 425-450.
- HOLZINGER W.E. (1999b): Taxonomie und Verbreitung ausgewählter Zikadenarten Österreichs (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha). — Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden **21**: 259-264.
- HOLZINGER W.E. & W. FRÖHLICH (2002, in Druck): Zikaden (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha). — In: Salzlebensräume Österreichs. Umweltbundesamt, Wien, Grüne Reihe.
- HOLZINGER W.E., FRÖHLICH W., GÜNTHART H., LAUTERER P., NICKEL H., OROSZ A., SCHEDL W. & R. REMANE (1997): Vorläufiges Verzeichnis der Zikaden Mitteleuropas (Insecta: Auchenorrhyncha). — Beitr. Zikadenkunde. **1**: 43-62.
- HOLZINGER W.E., JANTSCHER E. & R. REMANE (1996): Erstnachweise von Zikaden aus Österreich, mit Bemerkungen zu weiteren Arten (Insecta: Homoptera, Auchenorrhyncha). — Linzer biol. Beitr. **28/2**: 1149-1152.
- HOLZINGER W.E. & V. NOVOTNÝ (1998): Die Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) des Pürgschachener Moores (Steiermark, Österreich). — Beitr. Zikadenkunde. **2**: 53-56.
- IRMLER U. & B. HEYDEMANN (1986): Die ökologische Problematik der Beweidung von Salzwiesen an der Niedersächsischen Küste - am Beispiel der Leybucht. — Beih. Schr.-R. Natursch. u. Landschaftspf. Niedersachsen **15**: 1-115.
- KLIMEŠ L., NOVOTNÝ V. & J. KLIMEŠOVÁ (1991): Plant and Auchenorrhyncha communities of a drained pond. — Acta UPO, Fac. rer. nat. **104**, Biol. **31**: 59-69.
- KNIGHT W.J. (1974): The evolution of the Holarctic leafhopper genus *Diplocolenus* RIBAUT, with descriptions and keys to subgenera and species (Homoptera: Cicadellidae). — Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. **29**(7): 359-413.
- KÖRNER M., SAYER M. & H. NICKEL (2001, in Druck): Zur Zikadenfauna eines norddeutschen Kiefernforstes - Abundanz, Phänologien und Methodenvergleich (Hemiptera, Auchenorrhyncha). — Beiträge zur Zikadenkunde **4**.
- KUNTZE A. (1937): Die Zikaden Mecklenburgs, eine faunistisch-ökologische Untersuchung. — Arch. Naturgesch., N.F. **6**: 299-388.
- LE QUESNE W. (1965): Hemiptera (Cicadomorpha) (excluding Deltocephalinae and Typhlocybinae). — Handb. Ident. Br. Insects II (2a).
- LEHMANN W. (1973): Untersuchungen der Zikadenfauna von Obstgehölzen. — Biol. Zbl. **92**: 75-95.
- LEISING S. (1977): Über Zikaden des zentralalpiner Hochgebirges (Obergurgl, Tirol). — Alpin-biol. Stud. **IX**: 1-69.
- LIPPERT W., MÜLLER N., ROSSEL S., SCHAUER T. & G. VETTER (1995): Der Tagliamento - Flussmorphologie und Auenvegetation der größten Wildflusslandschaft in den Alpen. — Jb. Ver. Schutz Bergwelt **60**: 11-70.
- LOUIS F. & K.-J. SCHIRRA (1997): Grüne Rebzikade - Ein Problem? — Das deutsche Weinmagazin **14**: 28-30.
- MALICKY H. (1977): Vergleichende Barberfallienuntersuchungen im Wiener Neustädter Steinfeld (Niederösterreich) und auf den Apetloner Hutweiden (Burgenland): Zikaden (Homoptera Auchenorrhyncha). — Ber. Arbgem. ökol. Ent. Graz **8**: 23-32.
- MANURUNG B. & W. WITSACK (2001, in Druck): Zur Embryonal- und Larvalentwicklung der Zikade *Psammotettix alienus* (DAHLBOM, 1851) (Hemiptera, Auchenorrhyncha). — Beiträge zur Zikadenkunde **4**.
- MARCHAND H. (1953): Die Bedeutung der Heuschrecken und Schnabelkerfe als Indikatoren verschiedener Graslandtypen. — Beitr. Ent. **3**: 116-162.
- MELBER A., PRÜTER J., ASSING V. & P. SPRICK (1996): Erste Ergebnisse der Erfassung ausgewählter Wirbellosen-Gruppen in einer kleinen Vegetationsinsel auf den Panzerübungsflächen des NSG Lüneburger Heide (Heteroptera; Homoptera, Auchenorrhyncha; Coleoptera, Carabidae, Staphylinidae, Curculionidae). — NNA-Ber. **9**(1): 93-102.
- MOLLEKEN H. & W. TOPP (1997): Die Insektenfauna auf Silberweiden (*Salix alba* L.): Einfluß des Geschlechts und der Pflegemaßnahmen. — Z. Ökol. Natursch. **6**: 193-206.
- MORRIS M.G. (1971): Differences between the invertebrate fauna of grazed and ungrazed grassland. IV. Abundance and diversity of Homoptera - Auchenorrhyncha. — J. appl. Ecol. **8**: 37-52.
- MORRIS M.G. (1973): The effects of seasonal grazing on the Heteroptera and Auchenorrhyncha (Hemiptera) of chalk grassland. — J. appl. Ecol. **10**: 761-780.
- MORRIS M.G. (1981a): Responses of grassland invertebrates to management by cutting. III. Adverse effects on Auchenorrhyncha. — J. appl. Ecol. **18**: 107-123.
- MORRIS M.G. (1981b): Responses of grassland invertebrates to management by cutting. IV. Positive responses of Auchenorrhyncha. — J. appl. Ecol. **18**: 763-771.
- MORRIS M.G. (1990): The Hemiptera of two sown calcareous grasslands. I. Colonization and early succession. — J. appl. Ecol. **27**: 367-378.
- MORRIS M.G. (1992): Responses of Auchenorrhyncha (Homoptera) to fertiliser and liming treatments at Park Grass, Rothamsted. — Agriculture, Ecosystems and Environment **41**: 263-283.
- MÜLLER H.J. (1978): Strukturanalyse der Zikadenfauna (Homoptera Auchenorrhyncha) einer Rasenkatena Thüringens (Leutratl bei Jena). — Zool. Jb. Syst. **105**: 258-334.

- MÜLLER N. (1995): River dynamics and floodplain vegetation and their alterations due to human impact. — Arch. Hydrobiol., Suppl. **101**(2): 477-512.
- MÜLLER N. & A. BÜRGER (1990): Flussbettmorphologie und Auenvegetation des Lech im Bereich der Forchacher Wildflusslandschaft (Oberes Lechtal, Tirol). — Jb. Ver. Schutz Bergwelt **55**: 123-154.
- MUSIL M. (1958): Beitrag zur Kenntnis der Zikadenfauna der Slowakei. I. Zikadenfauna der Steppebiotope. — Biologia (Bratislava) **13**(6): 419-427. (Slowak.).
- NAST J. (1972): Palaearctic Auchenorrhyncha (Homoptera). An annotated check list. — Polish Scientific Publ., Warszawa.
- NAST J. (1987): The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe. — Ann. zool. Warsz. **40**: 535-662.
- NAULT L.R. & J.G. RODRIGUEZ (Hrsg.) (1985): The leafhoppers and planthoppers. — John Wiley & Sons, New York.
- NICKEL H. & R. ACHTZIGER (1999): Wiesenbewohnende Zikaden im Gradienten von Nutzungsintensität und Feuchte. — Beitr. Zikadenkde. **3**: 65-80.
- NICKEL H. (1999a): Life strategies of Auchenorrhyncha species on river floodplains in the northern Alps, with description of a new species: *Macropsis remanei* sp. n. (Homoptera). — Reichenbachia **33**: 157-169.
- NICKEL H. (1999b): Zum Vorkommen einiger Zikadenarten in Bayern. — Nachr.-Bl. bayer. Ent. **48**(1/2): 2-19.
- NICKEL H. (2001, im Druck): Die Zikadenfauna der Hochmoore im Thüringer Wald vor 25 Jahren und heute. — Naturschutzreport **16**.
- NICKEL H., WITSACK W. & R. REMANE (1999): Rote Liste der Zikaden Deutschlands (Homoptera, Auchenorrhyncha) - Habitate, Gefährdungsfaktoren und Anmerkungen zum Areal. — Beitr. Zikadenkde. **3**: 13-32.
- NIEDRINGHAUS R. (1988): Kolonisationserfolg der Zikaden auf den jungen Düneninseln Memmert und Mellum (Homoptera: Auchenorrhyncha). — Drosera **88**(1/2): 105-122.
- NIEDRINGHAUS R. (1991): Analyse isolierter Artengemeinschaften am Beispiel der Zikadenfauna der ostfriesischen Düneninseln (Homoptera: Auchenorrhyncha). — Dissertation Univ. Oldenburg. 153 S.
- NIEDRINGHAUS R. (1994): Die Zikadenfauna der Nordseeinsel Helgoland (Homoptera: Auchenorrhyncha). — Faun.-Ökol. Mitt. **6**: 469-477.
- NIEDRINGHAUS R. (1997): Die Zikadenfauna (Homoptera: Auchenorrhyncha) einer intensiv genutzten Agrarlandschaft in Nordwestdeutschland. — Abh. Westf. Mus. Naturkde. **59**(4): 197-208.
- NIEDRINGHAUS R. & U. BRÖRING (1986): Wanzen und Zikaden (Homopteroidea - Heteroptera, Auchenorrhyncha) terrestrischer Habitate der ostfriesischen Insel Norderney. — Drosera **86** (1): 21-40.
- NIKUSCH I. (1976): Untersuchungen über die Zikadenfauna (Homoptera - Auchenorrhyncha) des Vogelsberges. — Jb. nass. Ver. Naturk. **103**: 98-166.
- NOVOTNÝ V. (1994a): Relation between temporal persistence of host plants and wing length in leafhoppers (Auchenorrhyncha, Hemiptera). — Ecol. Entomol. **19**: 168-176.
- NOVOTNÝ V. (1994b): Association of polyphagy in leafhoppers (Auchenorrhyncha, Hemiptera) with unpredictable environments. — Oikos **70**: 223-232.
- NOVOTNÝ V. (1995): Relationships between life histories of leafhoppers (Auchenorrhyncha - Hemiptera) and their host plants (Juncaceae, Cyperaceae, Poaceae). — Oikos **73**: 33-42.
- OBERDORFER E. (2000): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. — 8. Aufl., Ulmer, Stuttgart. 1050 pp.
- OKALI I. (1960): Homoptera Auchenorrhyncha einiger Biotope in der Umgebung von Bratislava. — Acta Fac. Rev. Nat. Univ. Comen. **4**: 353-363.
- OLTHOFF T. (1986): Untersuchungen zur Insektenfauna Hamburger Straßenbäume. — Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg **8** (127): 213-229.
- OSSIANNILSSON F. (1983): The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Part 3: The Family Cicadellidae: Deltocephalinae, Catalogue, Literature and Index. — Scandinavian Science Press, Kopenhagen.
- PETER H.-U. & S. ROTH (1996): Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna der Kiefernforste im NSG „Uhlstädter Heide“ bei Rudolstadt/Thüringen. 1. Das Arteninventar der Untersuchungsflächen. — Beitr. Ökol. **1**: 83-110.
- PETER H.-U. (1981): Weitere Untersuchungen zur Einnischung der Zikaden in den Halbtrockenrasen des Leutratal bei Jena. — Zool. Jb. Syst. **108**: 563-588.
- POST-PLANGG N. & H.-J. HOFFMANN (1982): Ökologische Untersuchungen an der Zikadenfauna des Bausenbergs in der Eifel - mit besonderer Berücksichtigung der Trockenrasen. — Decheniana, Beih. **27**: 184-240.
- PRESTIDGE R.A. (1982): The influence of nitrogenous fertilizer on the grassland Auchenorrhyncha (Homoptera). — J. appl. Ecol. **19**: 735-749.
- PRESTIDGE R.A. & S. McNEILL (1983): Auchenorrhyncha - host plant interactions: leafhoppers and grasses. — Ecol. Ent. **8**: 331-339.
- RAATIKAINEN M. (1967): Bionomics, enemies and population dynamics of *Javesella pellucida* (F.) (Homoptera, Delphacidae). — Annls. Agric. Fenn. **6**, Suppl. 2: 1-147.
- RAATIKAINEN M. (1971): Seasonal aspects of leafhopper (Hom. Auchenorrhyncha) fauna on oats. — Ann. Agr. Fenn. **10**: 1-8.
- RAATIKAINEN M. (1972): Dispersal of leafhoppers and their enemies to oat fields. — Ann. Agr. Fenn. **11**: 146-153.
- RAATIKAINEN M. & A. VASARAINEN (1971): Comparison of leafhopper faunae in cereals. — Ann. Agric. Fenn. **10**: 119-124.

- RAATIKAINEN M. & A. VASARAINEN (1976): Composition, zonation and origin of the leafhopper fauna of oatfields in Finland. — *Ann. Zool. Fenn.* **13**: 1-24.
- RABELER W. (1931): Die Fauna des Göldeitzer Hochmoores in Mecklenburg. — *Z. Morph. Ökol. Tiere* **21**: 173-315.
- RABELER W. (1951): Biozönotische Untersuchungen im hannoverschen Kiefernforst. — *Z. angew. Ent.* **32**: 591-598.
- RABELER W. (1957): Die Tiergesellschaft eines Eichen-Birkenwaldes im nordwestdeutschen Altmörnengebiet. — *Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. (N.F.)* **6/7**: 297-319.
- RABELER W. (1962): Die Tiergesellschaften von Laubwäldern (*Quercus-Fagetum*) im oberen und mittleren Wesergebiet. — *Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.* **9**: 200-229.
- REMANE R. (1958): Die Besiedlung von Grünlandflächen verschiedener Herkunft durch Wanzen und Zikaden im Weser-Ems-Gebiet. — *Z. ang. Ent.* **42**: 353-400.
- REMANE R. (1987): Zum Artenbestand der Zikaden (Homoptera: Auchenorrhyncha) auf dem Mainzer Sand. — *Mainzer naturw. Arch.* **25**: 273-349.
- REMANE R. & W. FRÖHLICH (1994a): Vorläufige, kritische Artenliste der im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesenen Taxa der Insekten-Gruppe der Zikaden (Homoptera Auchenorrhyncha). — *Marburger ent. Publ.* **2(8)**: 189-232.
- REMANE R. & W. FRÖHLICH (1994b): Beiträge zur Chorologie einiger Zikaden-Arten (Homoptera Auchenorrhyncha) in der Westpaläarkt. — *Marburger ent. Publ.* **2(8)**: 131-188.
- REMANE R. & H. REIMER (1989): Im NSG „Rotes Moor“ durch Wanzen (Heteroptera) und Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) genutzte und ungenutzte „ökologische Lizenzen“ im Vergleich zu anderen Mooren und der übrigen Rhön. — *Telma, Beih.* **2**: 149-172.
- REMANE R. & E. WACHMANN (1993): Zikaden: kennenlernen - beobachten. — *Naturbuch Verlag, Augsburg.*
- REUTER O.M. (1909): Charakteristik und Entwicklungsgeschichte der Hemipteren-Fauna (Heteroptera, Auchenorrhyncha und Psyllidae) der paläarktischen Coniferen. — *Acta Soc. Sci. Fenn.* **36(1)**: 1-129.
- ROMBACH R. (1999): Auswirkungen verschiedener Formen der Bewirtschaftung von Halbtrockenrasen auf die Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) am Beispiel der Enzian-Schillergras-Rasen (*Gentiano-Koelerietum*) der Nordeifel (Nordrhein-Westfalen). — *Diss. Univ. Bonn.* 346 pp.
- SCHAEFER M. (1973): Untersuchungen über Habitatbindung und ökologische Isolation der Zikaden einer Küstenlandschaft (Homoptera: Auchenorrhyncha). — *Arch. Natursch. Landschaftsforsch.* **13**: 329-352.
- SCHAUER T. (1998): Die Vegetationsverhältnisse an der oberen Isar vor und nach der Teiltrückleitung. — *Jb. Ver. Schutz Bergwelt* **63**: 131-183.
- SCHIEMENZ H. (1964): Beitrag zur Kenntnis der Zikadenfauna (Homoptera, Auchenorrhyncha) und ihrer Ökologie in Feldhecken, Restwäldern und den angrenzenden Feldern. — *Arch. Natursch. Landschaftsforsch.* **4**: 163-189.
- SCHIEMENZ H. (1968): Zur Zikaden- und Heuschreckenfauna der Naturschutzgebiete „Groß Machnow Weinberg“, „Große und Kleine Jahnberge“, „Geesower Hügel“, „Oderberge“, „Priesterschlucht“, „Wollberg und Oderbruchrand“ — Brandenburg. Naturschutzgebiete, Folge 5-10.
- SCHIEMENZ H. (1969): Die Zikadenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Homoptera, Auchenorrhyncha). Untersuchungen zu ihrer Phänologie, Ökologie, Bionomie und Chorologie. — *Ent. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **36**: 201-280.
- SCHIEMENZ H. (1971a): Die Zikadenfauna (Homoptera Auchenorrhyncha) der Erzgebirgshochmoore. — *Zool. Jb. Syst.* **98**: 397-417.
- SCHIEMENZ H. (1971b): Zur Zikaden- und Heuschreckenfauna des Naturschutzgebietes „Steinholz - Harsleber Berge“ — *Naturk. Jber. Mus. Heineanum* **5/6**: 47-52.
- SCHIEMENZ H. (1973): Zur Zikadenfauna (Homoptera Auchenorrhyncha) der Naturschutzgebiete „Steppenheide am Großen Seeberg“, „Schwellenburg“, „Alperstedter Ried“ und „Vessertal“ — *Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha* **1973**: 70-79.
- SCHIEMENZ H. (1975): Die Zikadenfauna der Hochmoore im Thüringer Wald und im Harz (Homoptera, Auchenorrhyncha). — *Faun. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **5**: 215-233.
- SCHIEMENZ H. (1976): Die Zikadenfauna von Heide- und Hochmooren des Flachlandes der DDR (Homoptera, Auchenorrhyncha). — *Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden* **6**: 39-54.
- SCHIEMENZ H. (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina, Insecta). Teil I: Allgemeines, Artenliste; Überfamilie Fulgoroidea. — *Faun. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **15**: 41-108.
- SCHIEMENZ H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina, Insecta). Teil II: Überfamilie Cicadoidea excl. Typhlocybinae et Deltocephalinae. — *Faun. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **16**: 37-93.
- SCHIEMENZ H. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina, Insecta). Teil III: Unterfamilie Typhlocybinae. — *Faun. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **17**: 141-188.
- SCHIEMENZ H., EMMRICH R. & W. WITSACK (1996): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Homoptera - Auchenorrhyncha (Cicadina, Insecta). Teil IV: Unterfamilie Deltocephalinae. — *Faun. Abh. staatl. Mus. Tierk. Dresden* **20**: 153-258.
- SCHMIDT U. & J. RUPP (1997): Zikadenschäden an Gurke auf der Insel Reichenau. — *Gemüse* **12**: 691-692.
- SCHÖPKE H. (1996): Untersuchungen zur Autökologie von Zikaden (Homoptera: Auchenorrhyncha) unter besonderer Berücksichtigung des Wasserangebotes im Verlauf der Embryogenese. — *Dissertation Univ. Halle/Saale.* 113 S.

- SCHRUFF G. & G. WEGNER-KIB (1999): Untersuchungen zum Auftreten der Grünen Rebenzikade *Empoasca vitis*. — Deutsches Weinbau-Jahrbuch **50**: 145-151.
- SCHULZ K. (1976): Zur Kenntnis der Gattung *Jassargus* ZACHVATKIN (Homoptera Auchenorrhyncha). — Diss. Univ. Marburg/Lahn.
- SCHWOERBEL W. (1957): Die Wanzen und Zikaden des Spitzberges bei Tübingen, eine faunistisch-ökologische Untersuchung. — Z. Morph. Ökol. Tiere **45**: 462-560.
- SIOLI E. (1996): Die Phytophagenfauna der Krautschicht (Cicadina, Heteroptera und Symphyta) verschiedener Waldtypen Schleswig-Holsteins. — Faun.-Ökol. Mitt., Suppl. **21**: 1-94.
- SOUTHWOOD T.R.E. & H.F. VAN EMDEN (1967): A comparison of the fauna of cut and uncut grasslands. — Z. ang. Ent. **60**: 188-198.
- STEWART A. (1988): Patterns of host-plant utilization by leafhoppers in the genus *Eupteryx* (Hemiptera: Cicadellidae) in Britain. — J. Nat. Hist. **22**: 357-379.
- STRUBING H. (1955): Beiträge zur Ökologie einiger Hochmoorzikaden (Homoptera - Auchenorrhyncha). — Österr. zool. Zeits. **6**: 566-596.
- SZWEDO J., GEBICKI C. & P. WEGIEREK (1998): Leafhopper communities (Homoptera, Auchenorrhyncha) of selected peat-bogs in Poland. — Roczn. Muz. górnösl. (Przyr.) **15**: 154-176.
- THARSEN J. (1987): Ökofaunistische Untersuchungen über Zikaden und Wanzen (Homoptera, Auchenorrhyncha, Heteroptera) der Vier- und Marschlande. — Dissertation Univ. Hamburg.
- TRÜMBACH H. (1959): Die Zikaden und Psylliden der Umgebung Erlangens, eine systematisch-ökologische Untersuchung. — Sitz.-ber. phys.-med. Soz. Erlangen **79**: 102-151.
- TSCHARNTKE T. & H.-J. GREILER (1995): Insect communities, grasses, and grasslands. — Annu. Rev. Entomol. **40**: 535-558.
- VIDANO C. (1965): A contribution to the chorological and oecological knowledge of the European Dikraneurini (Homoptera Auchenorrhyncha). — Zool. Beitr. (N.F.) **11**: 343-367.
- VIDANO C. & A. ARZONE (1987a): Typhlocybinae of broad-leaved trees and shrubs in Italy. 2. Betulaceae. — Estratt. Bollet. Inst. Ent. „Guido Grandi“ **16**: 257-267.
- VIDANO C. & A. ARZONE (1987b): Typhlocybinae of broad-leaved trees and shrubs in Italy. 4. Fagaceae. — Redia **70**: 171-189.
- WAGNER W. & H. FRANZ (1961): Unterordnung Homoptera. Überfamilie Auchenorrhyncha (Zikaden). — Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt **2**: 74-158. Innsbruck.
- WAGNER W. (1937): (Hom. Jass.). — *Bombus* **1**: 4.
- WAGNER W. (1955): Neue mitteleuropäische Zikaden und Blattflöhe (Homoptera). — Ent. Mitt. zool. Staatsinst. zool. Mus. Hamburg **1**(6): 163-194.
- WALOFF N. (1980): Studies on grassland leafhoppers and their natural enemies. — Adv. Ecol. Res. **11**: 81-215.
- WALTER S. (1996): Zikaden als Indikatoren für die Bewertung von Landschaftseinheiten. Ein Beispiel zur Charakterisierung der Drömlingsniederung (Sachsen-Anhalt). — Ber. 2. Auchenorrhyncha-Tagung 15.9.-17.9.1995 in Marburg: 15-24.
- WALTER S. (1998): Grünlandbewertung mit Hilfe von Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha): ein Beispiel aus dem Osterzgebirge. — Beitr. Zikadenkde. **2**: 13-38.
- WEBER A. & M. MAIXNER (1998): Survey of populations of the planthopper *Hyalesthes obsoletus* SIGN. (Auchenorrhyncha, Cixiidae) for infection with the phytoplasma causing grapevine yellows in Germany. — J. Appl. Ent. **122**: 375-381.
- WENDELBERGER G. (1950): Zur Soziologie der kontinentalen Halophytenvegetation Mitteleuropas unter besonderer Berücksichtigung der Salzpflanzengesellschaften am Neusiedler See. — Denkschr. Österr. Akad. Wiss., Math.-nat. Kl. **108**(5): 1-180.
- WISSKIRCHEN R. & H. HAEUPLER (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Ulmer, Stuttgart. 765 pp.
- WITSACK W. (1999): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Zikaden an ausgewählten Trockenstandorten in Sachsen-Anhalt. Teil 1: Trockenstandorte im „Unstrut-Triasland“ (Hemiptera: Auchenorrhyncha). — Reichenbachia **33**: 197-206.
- WONN L. (1956): Ökologische Studien über die Zikadenfauna der Mainzer Sande. — Jb. Nassau. Ver. Naturk. **92**: 81-122.

Anschrift der Verfasser:

Herbert NICKEL
Institut für Zoologie und
Anthropologie
Abt. Ökologie
Berliner Str. 28
D-37073 Göttingen
hnickel@gwdg.de

Dr. Werner E. HOLZINGER
Ökoteam - Institut für Faunistik
und Tierökologie
Bergmannsgasse 22
A - 8010 Graz
oekoteam@sime.com

Prof. Dr. Ekkehard WACHMANN
Institut für Biologie (Zoologie)
Königin-Luise-Str. 1-3
D - 14195 Berlin
ewachm@zedat.fu-berlin.de